

Rubrik
**Åtgärder vid stick- och
skärskador, lokal rutin för
Centralsjukhuset
Kristianstad (CSK)**

Dokumenttyp
Riktlinje

Faktaägare
Lundgren Åsa I

Gäller from
2020-08-19

Giltigt t o m
2023-09-30

Sida:

1 (2)

Författare
Lundgren Åsa I

Utskrivet dokument gäller inte som original!

Version:
6

Gäller för (enhet)
**Centralsjukhuset
Kristianstad; VO Medicin
Kristianstad; VO Infektion
Kristianstad**

Åtgärder vid stick- och skärskador, lokal rutin för Centralsjukhuset Kristianstad (CSK)

1. Följ alltid instruktionerna i Vårdhandboken, som finns här:

<http://www.vardhandboken.se/Texter/Stick--och-skarskador-samt-exponering-med-risk-for-blodburen-smitta-hos-personal/Oversikt/>

Följ därefter nedanstående lokala anvisningar:

2. Kontakta infektionsläkare (dagjour/läkare i beredskap) via CSK:s växel (internt 91000) för hjälp med riskbedömning, behov av åtgärder som exempelvis postexpositionsprofylax/behandling och uppföljning samt journaldokumentation.

3. Blodprov (utgångsvärde) tas på den exponerade medarbetaren.

4. Provtagning på patienten genomförs i de fall det är möjligt. Observera att patientens eller i vissa fall anhörigas medgivande krävs.

5. Använd ett serumrör. Märk med namn och personnummer.

6. Använd remiss nr: 13511 Serologi/Virologi Skåne som finns här på Labmedicins webbplats: <https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/remiss/> och fyll i dem enligt visningsexempel nedan. Alla rödmarkerade fält måste fyllas i.

OBS! Det är viktigt att din arbetsplats kund-kod skrivs i fältet ”Betalningsansvarig om annan än beställare”.

Uppge namnet på den infektionsläkare som har konsulterats i fältet ”remitterad av” - det gäller för både personal- och indexpatientremissen.

7. Blodprov med remisser lämnas på kem.lab för vidare transport med ordinarie provbil. Gör infektionsläkaren bedömningen att proverna ska skickas för akut analys, kontaktar han/hon mikrobiologen SUS Lund. Proverna sänds i så fall med taxi till:
Klinisk Mikrobiologi, Sölvegatan 23 B, 221 85 Lund.

8. För kompletterande information, se även Vårdprogram ”blodsmittetillbud” i Dokumentportalen > Skånes sjukhus nordost > Centralsjukhuset Kristianstad > VO Infektion > Blodsmittetillbud inom vården

Visningsexempel 1) Stick- och skärskador personal för ifyllande av remiss nr 13511:

Remiss Serologi / Virologi

Beställare Ange Kundkod

INFEKTIONSMOTTAGNINGEN
KDINNN, CSK
291 85 Kristianstad

Patientetikett / Patient ID och Namn

Personuppgifter - PERSONAL

Om annan ska debiteras ange kundkod: ARBETSPLATSENS KUNDKOD

Om välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta

Provtagningsdatum Tid Provtagare RSID

Remitterad av (RSID att namn i kläret):

Grunddiagnos, anamnes, frågeställning

STICK- OCH SKÄRSKADA HOS PERSONAL PÅ BLODFÖRENET FÖREMÅL FRÅN PATIENT

Insjukningsdag: Antiviral behandling: Patienten har nyligen erhållit blodprodukter / gammaglobulin

Serologi Antikroppspåvisning

Ett välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta

Vid kapillärprovtagning kontakta laboratoriet för rätt antal rör

Bakterier

- Borrelia
- Neuroborrelia (Ljkor och Genum)
- Chlamydia pneumoniae
- Helicobacter pylori
- Legionella
- Mycoplasma pneumoniae
- Pertussis
- Toxoplasma

Virus

- Adenovirus*
- Influenta A & B - virus *
- TBE
- Cytomegalovirus (CMV)
- Aktuell infektion
- Bärarskap
- Epstein Barr-virus (EBV)
- Aktuell infektion
- Bärarskap
- Herpes simplex-virus (HSV)
- Aktuell infektion
- Bärarskap
- Morbillivirus
- Aktuell infektion
- Immunitet
- Parotitvirus
- Aktuell infektion
- Immunitet

Quantiferon

Prov tas i specialrör. Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Får ej kylas. Ej inkuberade prov skall vara på lab inom 16tim från provtagning må-fre. Nedanstående uppgifter ska vara ifyllda för att analys ska göras

Screening blodsmitta

Ett välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta. Kapillärprov rör 3-4 st

- Blodsmittascreening (HIV, hepatit B & C)
- Syfilis (lues)
- Screening av gravida (HIV, hepatit B, Syfilis, rubella-immunitet - om ej känd)
- HIV screeningtest (anti-HIV och HIV-antigen)
- Hepatit A
- IgM (aktuell infektion)
- IgG vaccination/immunitet
- Hepatit B
- HBsAg (infektion)
- Anti-HBc
- Anti-HBs (vaccination)
- Hepatit C
- Anti-HCV
- HTLV
- HTLV I & II screeningtest

Viruspåvisning

- Blåssekret, genitalprov
- Blåssekret
- Bronskölvätska
- EDTA-plasma
- Faeces (burk)
- Likvor (Csv)
- Nasofarynxspirat
- Nasofarynx pinnprov
- Urin
- Konjunktivalsekret
- Önskad undersökning
- Adenovirus
- BK-virus
- Cytomegalovirus (CMV)
- Inki kvantifiering
- Enterovirus
- Epstein-Barr-virus (EBV)
- Gastroenteritpanel virus (norovirus, rotavirus, sapovirus, astrovirus och adenovirus typ 40&41)

Visningsexempel 2) Stick- och skärskador patient för ifyllande av remiss nr 13511:

Remiss Serologi / Virologi

Beställare Ange Kundkod

INFEKTIONSMOTTAGNINGEN
KDINNN, CSK
291 85 Kristianstad

Patientetikett / Patient ID och Namn

Personuppgifter - PATIENT

Om annan ska debiteras ange kundkod: ARBETSPLATSENS KUNDKOD

Om välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta

Provtagningsdatum Tid Provtagare RSID

Remitterad av (RSID att namn i kläret):

Grunddiagnos, anamnes, frågeställning

PERSONAL UTSATT FÖR STICK- OCH PÅ BLODFÖRENET FÖREMÅL FRÅN PATIENT—"INDEX"

Insjukningsdag: Antiviral behandling: Patienten har nyligen erhållit blodprodukter / gammaglobulin

Serologi Antikroppspåvisning

Ett välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta

Vid kapillärprovtagning kontakta laboratoriet för rätt antal rör

Bakterier

- Borrelia
- Neuroborrelia (Ljkor och Genum)
- Chlamydia pneumoniae
- Helicobacter pylori
- Legionella
- Mycoplasma pneumoniae
- Pertussis
- Toxoplasma

Virus

- Adenovirus*
- Influenta A & B - virus *
- TBE
- Cytomegalovirus (CMV)
- Aktuell infektion
- Bärarskap
- Epstein Barr-virus (EBV)
- Aktuell infektion
- Bärarskap
- Herpes simplex-virus (HSV)
- Aktuell infektion
- Bärarskap
- Morbillivirus
- Aktuell infektion
- Immunitet
- Parotitvirus
- Aktuell infektion
- Immunitet

Quantiferon

Prov tas i specialrör. Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Får ej kylas. Ej inkuberade prov skall vara på lab inom 16tim från provtagning må-fre. Nedanstående uppgifter ska vara ifyllda för att analys ska göras

Screening blodsmitta

Ett välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta. Kapillärprov rör 3-4 st

- Blodsmittascreening (HIV, hepatit B & C)
- Syfilis (lues)
- Screening av gravida (HIV, hepatit B, Syfilis, rubella-immunitet - om ej känd)
- HIV screeningtest (anti-HIV och HIV-antigen)
- Hepatit A
- IgM (aktuell infektion)
- IgG vaccination/immunitet
- Hepatit B
- HBsAg (infektion)
- Anti-HBc
- Anti-HBs (vaccination)
- Hepatit C
- Anti-HCV
- HTLV
- HTLV I & II screeningtest

Viruspåvisning

- Blåssekret, genitalprov
- Blåssekret
- Bronskölvätska
- EDTA-plasma
- Faeces (burk)
- Likvor (Csv)
- Nasofarynxspirat
- Nasofarynx pinnprov
- Urin
- Konjunktivalsekret
- Önskad undersökning
- Adenovirus
- BK-virus
- Cytomegalovirus (CMV)
- Inki kvantifiering
- Enterovirus
- Epstein-Barr-virus (EBV)
- Gastroenteritpanel virus (norovirus, rotavirus, sapovirus, astrovirus och adenovirus typ 40&41)