

Primär eradikering av *Helicobacter pylori* vid brist på klaritromycin

Det råder brist på ett flertal förpackningar med klaritromycin och tillgången kommer att variera de närmaste månaderna. Förpackningar om ca 100 tabletter kan finnas, men är olämpliga att förskriva vid eradikering av *Helicobacter pylori* till enskilda individer. Under tiden rekommenderar Nationella Strama nedanstående alternativ som baseras på rekommendationer av National Institute for Health and Care Excellence (NICE) samt Svensk gastroenterologisk förening.

Doseringen av amoxicillin är modifierad av Strama utifrån den för närvarande begränsade tillgången på vissa tablettstyrkor. Observera att rekommendationerna nedan gäller primär eradikeringsbehandling av *Helicobacter pylori* och inte vid terapivikt eller liknande.

- PPI x 2 + amoxicillin 750 mg x 3 + metronidazol 400 mg x 2 i 7 dagar

Vid penicillinallergi:

- PPI x 2 + doxycyklin 100 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 i 7 dagar

Ytterligare alternativ innehållande levofloxacin kan vara aktuella om ovanstående alternativ ej tolereras, efter kontakt med infektionskonsult.

Referenser:

[Gastro-oesophageal reflux disease and dyspepsia in adults: investigation and management \(nice.org.uk\)](https://www.nice.org.uk/guidance/NG58)

[Outredd dyspepsi, ulkus samt funktionell dyspepsi \(svenskgastroenterologi.se\)](https://www.svenskgastroenterologi.se/utredd-dyspepsi-ulkus-samt-funktionell-dyspepsi)

NAG Strama
2024-06-10