


BRUKSANVISNING FÖR ADMINISTRATION AV ANDAPSIN REKTALT

Hur verkar Andapsin?

Strålproktopati är en sen eller kronisk strålpåverkan i rektum som karakteriseras av fibros, stenosis och blödningar. Rektalblödningen uppstår främst på grund av sköra slemhinnor och förlust av kapillärer i submukosan vilket leder till ny, dock onormal, kärlbildning så kallad teleangiektasia i rektalväggen med blödning som kan vara svår att behandla. Andapsin (Sukralfat) har en lokal slemhinneskyddande effekt, detta genom en mekanisk bindning till slemhinnan. Bindningen till skadad slemhinna är större än till frisk vävnad. Studier har visat att Andapsin administrerat i ändtarmen kan minska blödningar vid strålproktopati. Du ska göra behandlingen morgon och kväll i fyra veckor. Behandlingen går att upprepa.

Instruktion för hur du ska göra



Dra upp 4,5 ml vanligt kranvatten i en 5 ml spruta och spruta ner vattnet i burken. Tryck ut 2 styck tabletter Andapsin 1 gram och lägg i burken. Tabletterna är lösliga. Sätt på plastkanylen på sprutan, rör om tills tabletterna är helt upplösta.



Dra upp den mjölkvita vätskan i sprutan. Det blir ca 5,5 ml.



Smörj spetsen med glidmedel eller Vaseline. Lagg dig på sidan, för upp spetsen i ändtarmen och spruta in allt innehåll i sprutan. Ligg kvar 10 minuter.