

Information till Vårdtagare

Skelettscintigrafi

Undersökningen utförs vid misstanke om skelettförändringar.

Hur lång tid tar det?

Du kommer till oss vid två olika tillfällen under samma dag. Vid första tillfället, som tar cirka 15-30 minuter, får du en injektion. Tre till fyra timmar efter injektionen kommer du tillbaka för bildtagning som tar cirka 30-60 minuter.

Före

Kontakta oss före undersökningen om:

- du är gravid eller ammar
- du nyligen har genomgått en annan undersökning eller behandling med radioaktivt ämne

I övrigt behöver du inte förbereda dig på något speciellt sätt.

Under

Du får en spruta med en liten mängd radioaktivt ämne i ett blodkärl i armen. Det radioaktiva ämnet är inte farligt och strålningen motsvarar en vanlig röntgenundersökning.

[Information om radioaktiva läkemedel \(1177.se\)](http://1177.se)

Efter injektionen får du lov att lämna avdelningen. Du kan äta och dricka som vanligt. Det är bra att dricka lite extra under de här timmarna.

Efter tre till fyra timmar kommer du tillbaka till avdelningen för bildtagning. Du får ligga på en brits medan en gammakamera tar bilder under cirka 30 till 60 minuter.

Förutom nålsticket i armen innebär undersökningen inga obehag.

Efter

Bilderna bedöms av en läkare och svaret skickas till den mottagning eller avdelning som skickade dig till undersökningen. De ger dig resultatet.