

Koll på läkemedelslistan!

Uppmana patienten att ta med en lista över alla sina läkemedel till besöket, då det inte finns en helt samlad läkemedelslista i vården.



Skriv ut affisch till väntrum



Beställ broschyren till väntrummet.

Skicka med vid kallelse till mottagningsbesök.

Fråga om din patient har med sig en aktuell läkemedelslista och gör en läkemedelsavstämning

- Stäm av med patienten/anhörig – använd inte läkemedelslistan från föregående vårdtillfälle utan avstämning.
- Används receptfria läkemedel eller naturläkemedel?
- Patientens förskrivna och uthämtade läkemedel ses i Nationella läkemedelslistan som nås via Förskrivningskollen.
- Makulering av e-recept är nu även möjligt i PMO. Metodstöd för läkemedelsavstämning finns på vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/

Koll på läkemedelslistan – foldrar med praktiska tips för aktuell läkemedelslista i PMO och Melior

- Vid insättning av tillfälliga ordinationer/kurläkemedel – lägg in utsättningsdatum.
- Markera om patienten har dosdispenserade läkemedel och uppdatera listan i Pascal.
- Dokumentera när en läkemedelsavstämning är gjord. Använd term/sökord Läkemedelsavstämning, källor (PMO) respektive Läkemedelsavstämning, slutförd (Melior).



Ge din patient en aktuell läkemedelslista!

Goda råd är inte dyra

– om att undvika onödiga läkemedelskostnader

Läkemedelskostnaderna ökar, främst på grund av att nya medicinskt välmotiverade men kostsamma läkemedel introduceras. För att skapa utrymme att använda de nya läkemedlen gäller det att undvika alla onödiga kostnader för läkemedel. Därför finns ett webbaserat kapitel där man med stöd av Skånelistan och andra rekommendationer från Läkemedelsrådet kan se över sin verksamhets läkemedelsförskrivning.

Goda råd är inte dyra – om att undvika onödiga läkemedelskostnader.



Skanna QR-koden för att komma direkt till kapitlet!

Exempel

GODA RÅD INOM ASTMA-KOL

- Glöm inte rökavvänjning hos KOL-patienter, mer effektivt än något läkemedel.
- Vid nyinsättning av LABA/ICS välj Bufomix. Dessutom rekommenderas aktivt byte till Bufomix hos Symbicort-användare. Prisskillnad 25 %. Informera patienten och instruera om tekniken vid byte.
- Utvärdera och sätt ut KOL-behandling som inte hjälper, beakta inhalationsteknik speciellt hos äldre.
- Avstå från förskrivning av peroralt acetylcystein.
- Tänk på att montelukast inte har indikation vid KOL.

För mer information, se kapitel Astma-KOL i Bakgrundsmaterial till Skånelistan 2022