

9.0 Diklofenac

Preparatnamn:	Diclofenac®, Voltaren®
Beredningsform:	Injektionsvätska
Styrka:	25 mg/ml
Terapeutisk effekt:	Antiinflammatorisk, analgetisk och febernedsättande effekt (NSAID)
Indikationer:	Akut flank- / buksmärta där gallsten eller njursten misstänks primärt.
Administrationssätt:	Djup intramuskulär injektion (im)
Dosering vuxna	Vuxen 3 ml (=75 mg) im
Dosering barn:	≥14 år som vuxna. I övrigt inte för barn.
Kontraindikationer:	<ul style="list-style-type: none">• Magsår• Svår hjärtsvikt• Njursjukdom• Överkänslighet mot ASA eller annat NSAID-preparat• Koagulationsrubbing• Waranbehandling
Försiktighet:	<ul style="list-style-type: none">• Inflammatorisk tarmsjukdom• Nedsatt leverfunktion• Astma• Cirkulatorisk påverkan (hypotension)
Biverkningar:	<ul style="list-style-type: none">• Huvudvärk, yrsel• Illamående, kräkning, buksmärta• Bronkospasm• Anafylaktiska reaktioner, ex hypotension
Interaktioner	Undvik samtidig behandling med ASA
Överdoser	Symptom <ul style="list-style-type: none">• Illamående, kräkning, buksmärta• Yrsel, somnolens• Oro, hallucinationer