

9.0 Midazolam

Preparatnamn:	Midazolam
Beredningsform:	Injektionslösning
Styrka:	5 mg/ml, 1 mg/ml
Terapeutisk effekt:	Benzodiazepim preparat med en kort duration på grund av en snabb metabol transformering och intensivt sederande och sömninducerande, ångestdämpande, antikonvulsiva och muskelrelaxerande effekter.
Indikationer:	Epileptiska kramper. Tillägg till ketamin för att motverka hallucinogena biverkningar men ges då i den lägre styrkan och i andra doser. Intranasalt vid oro.
Administrationssätt:	in, im, iv
Dosering vuxna:	Kramper 5 mg/ml , intramuskulärt i första hand <50 kg 1 ml >50 kg 2 ml Vid behov kan ytterligare en halv dos ges efter 10 min. För högre doser krävs RLS-kontakt. Oro 0,5 – 1 ml in. Sedering i samband med ketamin 1 mg/ml: 1–2,5 ml iv.
Dosering barn:	Kramper 5 mg/ml: 0,2 mg/kg. > 13 kg: Intramuskulärt - i andra hand intranasalt. < 13 kg intranasalt – ej intramuskulärt. Vid behov kan ytterligare en halv dos ges efter 10 min. För högre doser krävs RLS-kontakt. Sedering i samband med ketamin 1 mg/ml: 0,025 mg/kg. EJ till prematura barn och barn < 6 månader

Läkemedel

Faktaägare: Granquist Åsa
Dokumentförvaltare: Granquist Åsa
Styrande dok (ej labmedicin), (ST) Riktlinje

Gäller för: Region Skånes Ambulanssjukvård

Kontraindikationer:

Allergi mot läkemedlet eller andra bensodiazepiner.

Vid antikoagulationsbehandling eller misstanke om annan allvarlig **koagulationsstörning** ges preparatet intranasalt.

Försiktighet:

Beredskap för assisterad ventilation och syrgas ska finnas.

Biverkningar: