

## Läkemedel

**Faktaägare:** Granquist Åsa  
**Dokumentförvaltare:** Granquist Åsa  
Styrande dok (ej labmedicin), (ST) Riktlinje

**Gäller för:** Region Skånes Ambulanssjukvård

## 9.0 Ondansetron

<b>Preparatnamn:</b>	Ondansetron, Zofran
<b>Beredningsform:</b>	Injektionslösning, Munlöslig tablett
<b>Styrka:</b>	2 mg/ml 4 mg/tablett
<b>Terapeutisk effekt:</b>	Centralt och perifert verkande antiemetikum.
<b>Indikationer:</b>	Illamående, bulbskada (se ögonskada).
<b>Administrationssätt:</b>	po, iv. Ges som långsam intravenös injektion, speciellt hos äldre.
<b>Dosering vuxna:</b>	2 ml iv alternativt 1tabl po.
<b>Dosering barn &gt; 1 mån:</b>	> 1 mån: 0,1 mg/kg (0,05 ml/kg). Max 4 mg. barn > 40 kg alternativt 1tabl po
<b>Kontraindikationer:</b>	Känd allergi mot 5-HT3-antagonister, känt långt QT-syndrom. Patienter som står på apomorfin (medel som används av vissa med Parkinsons sjukdom och kan heta Apomorfin, Apo-Go).
<b>Försiktighet:</b>	Ges endast efter särskilt övervägande vid graviditet och amning.
<b>Biverkningar:</b>	Vid eventuell överdosering; EKG övervakning då Ondansetron förlänger QT-intervallet. Allergisk reaktion - Reaktionen i luftvägarna bör behandlas symptomatiskt, och bör noggrant beaktas som möjliga förstadier till överkänslighetsreaktioner.