

Medicinsk service

VO Ambulans

Faktaägare Åsa Granqvist, Ambulansöverläkare,
Överläkarforum och verksamhetschefer

2020-05-12



Giltigt from 2020-05-12. Gäller ambulanssjukvården i Skåne.
Uppdaterad 2021-12-01. Inga förändringar.

Direktiv – skyddsklädsel som komplement till basala hygienrutiner

Bakgrund

Patienter kan ha atypiska eller otydliga symtom vid covidsjukdom. De kan söka för andra skäl än just infektion och deras anhöriga kan vara smittade.

Åtgärd

För att minimera risken för exponering av eventuell smitta finns ett behov av ett barriärskydd som används vid kontakt med samtliga patienter.

Genomförande

Vid prio 1 ärenden med följande utlarmning skall minst en i teamet vara klädd för att hantera patient med aerosolsmitta enligt gällande instruktion, (långärmat förkläde, handskar, visir, FFP2 andningsskydd/skyddsmask).

1. Hjärtstopp
2. Medvetslös/pågående kramp/Stroke
3. Andningssvårigheter
4. Bröstsmärta
5. Infektion/feber
6. Kräkning/diarré

Vid alla ärenden där det framgår att patienten har andningsunderstöd med t.ex. CPAP skall båda i teamet vara klädd för att hantera patient med aerosolsmitta (*förekommer alltid vid kombination luftvägsinfektion/CPAP*).

Vid alla ambulansuppdrag bör visir initialt användas om man inte är "covid-klädd". Vid vidare vård avgör medarbetaren om man ska förstärka skyddsnivån eller avveckla visiret. Arbetssätt "Knacka – backa – snacka".

Vid misstanke om eller konstaterad Covid-19 smitta skall visir kompletteras med övrig skyddsutrustning enligt gällande instruktion, (*långärmat förkläde, handskar, visir, II eller FFP2 (aerosolsmitta) andningsskydd/skyddsmask*).