

## Medicinsk service

VO Ambulans

Faktaägare Åsa Granqvist överläkare

### Klädsel vid misstänkt och bekräftad smitta i Ambulans

2020-05-06

Uppdaterad 2021-12-01

	Nivå 1 = Droppsmitta (ex influensa, Gastroenterit)	Covid och Aerosolproducerande procedurer ( CPAP,HLR mm)	Nivå 2 = Luftburen (ex Mässling)	Nivå 3 = Högrisksmitta (ex Ebola – stäm av med inf.konsult)
Andningsskydd	II/IIR	FFP2	FFP3	FFP3
Handskar	Ja	Ja	Ja	Sterial - dubbla
Skyddsförkläde m lång ärm	Ja	Ja	Ja	Ja
Ögonskydd	Visir	Visir	Visir	Goggles
Skoskydd	Nej	Nej	Nej	Ja
Overall -Microchem 3000	Nej	Nej	Nej	Ja
Op-huva	Nej	Nej	Nej	Ja
Munnskydd patient	Ja, om risk för stänk	Ja, om risk för stänk	Ja, om risk för stänk	Ja, om risk för stänk

- Iaktta basala hygienrutiner. Sprita händerna regelbundet, hjälp patienten med att sprita händerna vb. Ha alltid ett pkt skyddsförkläde med lång ärm i benfickan/väskan.
- Stäng mellan förarhytt och vårdutrymme.
- Maxa utsuget.
- Ingen ören utrustning i förarhytten. D.v.s. ta av handskar, förkläden etc och sprita enligt instruktion INNAN ni sätter er fram. *Undantag ev Högrisk och tidskritiska patienter. Bilen måste då saneras inklusive förarhytt.*
- Förbered med skyddsutrustning så att ni kan hjälpa till med patienten när ni stannar.

**Andningsskydd:** Skillnad II och IIR ligger i "R" – resistens mot väta. Visir ersätter "R". Skyddar mot droppsmitta. Använd den modell ni har.

## Medicinsk service

VO Ambulans

Faktaägare Åsa Granqvist överläkare

FFP2 och FFP3, virussyddet är likvärdigt vad gäller Covid. Skyddar mot inhalation av små luftburna partiklar vid aerosolgenererande procedurer (AGP). Måste sluta tätt runt ansiktet.