

Läkemedel mot illamående

Vi har beslutat att inte längre ha PRIMPERAN i ambulanserna, som läkemedel mot illamående utan istället gå över till ONDANSETRON (tidigare känt som Zofran). Detta för att Primperan är kontraindicerat vid ileus, ger frekventa extrapyrimidala biverkningar samt att Ondansetron har färre biverkningar och kontraindikationer, och har även sjunkit i pris jämfört med tidigare.

Texten i de reviderade behandlingsriktlinjerna som snart kommer ut lyder:

Ondansetron

Administreras po eller iv. Styrka 4 mg munsönderfallande tablett, 2 mg/ml injektionslösning.

Indikation: Illamående.

Kontraindikationer: Känd allergi mot 5-HT₃-antagonister, känt långt QT-syndrom.

Dosering vuxna: 1–2 st munsönderfallande tabletter som engångsdos, Placeras på tungan. Alternativt 2–4 ml långsam intravenös injektion.

Dosering barn >6 mån: 0,1 mg/kg (0,05 ml/kg), som långsam intravenös injektion. Alternativt kan 1 st munsönderfallande tablett ges till barn på > 40 kg.

Det är nu fritt fram att börja använda ONDANSETRON enligt ovan behandlingsanvisning.

Lund 2014-07-08

Maria Janson

T f Chefläkare Region Skånes Prehospitala Enhet