

TRANEXAMSYRA (TXA)

Preparatnamn:
Beredningsform:
Styrka:
Terapeutisk effekt:

Cyklokapron®

Injektionsvätska
100 mg/ml

Tranexamsyra utövar en hämmande effekt på plasminogenaktiveringen, d v s omvandlingen av plasminogen till plasmin och hjälper därmed till att behålla det bildade blodkoaglet längre och minskar därmed sannolikt blödningen.

Indikationer:

TXA ges IV eller IO vid stark klinisk misstanke på inre, icke kompressibel traumatisk blödning med eller utan cirkulatorisk påverkan.
TXA kan även ges vid postpartumblödning.

Administrationssätt:

Intravenös injektion (iv) eller intraosseös injektion (IO)

Dosering:

Vuxen ≥ 14 år **10 ml (=1 g) iv** ges långsamt, ca 1 ml/min, så snart efter traumat som möjligt.
Får ges senast 3h efter skadetillfället.

Barn: Inj **tranexamsyra** 100mg/ml, 15mg/kg iv 1ml/min.

Kontraindikationer:

- Aktiv tromboembolisk sjukdom
- Överkänslighet mot Tranexamsyra

Försiktighet:

Under inga omständigheter får administrering av Cyklokapron fördröja transport av patienten till sjukhus.

Biverkningar:

- Lågt blodtryck kan uppträda efter för snabb IV/IO injektion
- Illamående/kräkningar kan uppträda efter för snabb iv/io injektion
- Hudutslag