

## Indikationer för patientnära mätning av B-Ketoner

I Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer 2014 finns dessa rekommendationer för Egenmätning av blodketoner:

1. Vid insulinpumpsbehandling ska ketoner mätas på vida indikationer även om blodsockret inte är högt. Akut sjukdom vid insulinpumpsbehandling – misstänk alltid ketoacidosis tills motsatsen är bevisad. Speciell mätare för blodketoner finns och bör förskrivas och användas av alla patienter som har insulinpumpsbehandling.
2. Typ 1-diabetes med hög risk för diabetesketoacidosis, graviditet och blöjburn är andra patientgrupper som bör ha utrustning för mätning av blodketoner.

### Rekommenderad metod för B-Ketoner

Vi rekommenderar GlucoMen LX Plus från Menarini (beställnings nr 22547). Detta instrument är upphandlat med avseende på patientsäkerhet, pris samt enkelt och säkert handhavande.

### Mer information

För mer information, t ex om referensintervall, beslutsgränser och indikationer, se Diabetologytt nr 7-8 2012.

### För informationen ansvarar

Labmedicin, Klinisk kemi:  
*Kristina Persson*  
Överläkare/Metodansvarig

*Eva Lindström*  
S-Biomedicinsk analytiker