

Remiss prenatal genetisk analys – medföljande föräldrprov

Skickas till <i>Klinisk genetik</i> <i>Medicinsk Service, Labmedicin</i> <i>221 85 Lund</i>	Personnr:										
	Namn:										
	Adress: Tel:										
Tidigare hänvisning:	Provtagn.datum:										
	Remissdatum:										
	Rem läkare (klartext):										
	Rem avd/mott:										
Medföljande blodprov från förälder ¹⁻³	Rem avd/mott Tel:										
	Kundkod (MG-kod):	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
Till provtagaren, skicka 5-6 ml (EDTA-rör) direkt till ovanstående adress. Får ej centrifugeras eller frysas	Plats för Klinisk Genetiks etikettering										
Eventuella symptom hos förälder: (som eventuellt kan kopplas till ultraljudsfynd hos fostret)											
Eventuell annan släktanamnes:											
<ol style="list-style-type: none">1) Läs aktuella provtagningsanvisningar och PM på Labmedicins analysportal (sökord prenatal): "Amnionvätska - prenatal genetisk analys" respektive "Korionvillibiopsi - prenatal genetisk analys" www.analysportalen-labmedicin.skane.se2) Om trio-arrayanalys önskas, på remiss "prenatal genetisk analys" bifoga blodprov från båda föräldrarna3) Vid riktade frågeställningar och vid känd ärftlig kromosomavvikelse ska provet åtföljas av maternellt blodprov											
<p>Biobanken, inskickandet av denna remiss bekräftar att patienten (alt vårdnadshavare/närstående) har fått information om och samtycker till att provet och tillhörande personuppgifter sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.</p> <p>[] Nej, provgivaren samtycker inte till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. En "nej-talong" har skickats in, hämtas på www.rbc Syd.se</p> <p>[] Är vid provtillfället oförmögen att lämna samtycke.</p>											