

# Koncernkontoret

## Läkemedelsrådet

### REGIONAL LÄKEMEDELSRIKTLINJE

|            |   |               |            |
|------------|---|---------------|------------|
| Process    | 3.3.9   | Version       | 2          |
| Skapad av  | <a href="#">Skånes digitala vårdssystem (SDV)</a> | Dokument id   | L1SM1-02   |
| Godkänd av | Läkemedelsrådet                                   | Godkänt datum | 2024-05-14 |
| Gäller för | Utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne    | Gäller t.o.m. | 2026-05-14 |

## Spädningsschema av vissa icke-antibiotika, vuxen

### 1 Allmänna instruktioner och kommentarer till spädningsschemat

- Spädningsschemat är framtaget för vuxna, och är en rekommendation. Det kan finnas andra sätt att späda.
- Undvik administrering i samma infart/lumen som annat läkemedel (inkl. elektrolyter och TPN) om inte kompatibiliteten är känd. För kompatibilitetsfrågor, kontakta farmaceut eller [Läkemedelsinformationscentralen \(LÄIF\)](#).
- För narkotiska preparat beakta säkerhet och kontroll av den spädda injektionslösningen som eventuellt sparas eller destrueras. Rutin för detta bör beskrivas i lokal rutin.
- NaCl = Natriumklorid 9 mg/mL injektions-/infusionsvätska
- Rutinen gäller enbart intravenös administrering, för spädning vid andra möjliga administreringsvägar hänvisas till preparatens produktresuméer eller andra rutiner.
- Observera att denna instruktion enbart beskriver iordningsställande och administration, och inte ersätter FASS eller tillverkarens rekommendationer i vad övrigt som behöver beaktas under och/eller efter administrering av respektive preparat. Det förutsätts även att visuell kontroll görs innan administrering kan ske.

Tabell 1: Spädningsschema icke-antibiotika vuxen

**Observera instruktioner på sida 1.**

| Substans (läkemedel)                                       | Dos/styrka    | Administreringsväg   | Spädning                          | Slutkoncentration |
|--|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Klonidin (Catapresan øresund pharma, Ebb medical, Orifarm) | 150 mikrog/mL | Intravenös injektion | 1 mL klonidin späds med 9 mL NaCl | 15 mikrog/mL      |
| Morfin (Morfin Abcur/Meda/ Kalceks)                        | 10 mg/mL      | Intravenös injektion | 1 mL morfin späds med 9 mL NaCl   | 1 mg/mL           |
| Oxikodon (Oxycodone Hameln, OxyNorm, Lindoxa)              | 10 mg/mL      | Intravenös injektion | 1 mL oxikodon späds med 9 mL NaCl | 1 mg/mL           |

## 2 Förändringar jämfört med tidigare version

2024-05-14

| Avsnitt | Uppdatering   |
|---------|---|
|         | Ny mall. Uppdatering efter avregistrering av ketobemidon samt justering till aktuella läkemedelsnamn. |

## 3 Författare

Workstream Medications, SDV- [Skånes digitala vårdssystem \(SDV\) - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

Granskad av:

[LAG läkemedel hjärt- och kärlsjukdomar](#)

[LAG läkemedel smärta](#)

*Dokumentet är fastställt och signerat se läkemedelsrådets protokoll daterad 2024-05-14 [Läkemedelsrådet - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)*