

Dokumentet är fastställt av Läkemedelsrådet 2020-12-17

Riktlinjen är senast uppdaterad 2020-12-17

Riktlinjen är giltig t o m 2022-12-17

Regionala riktlinjer för användning av FGM (Freestyle Libre 1 respektive 2) till personer med typ 2 diabetes i Region Skåne

Indikationer

Personer med typ 2 diabetes som behandlas med bas- och måltidsinsulin och har:

- kvarstående HbA1c över 70 mmol/mol trots anpassning av doser och eventuellt byte av insulinsort

och/eller

- återkommande allvarliga hypoglykemier (=som krävt assistans av annan person) trots anpassning av doser och eventuellt byte av insulinsort

Användning av FreeStyle Libre 2 kan ske, om inte behovet kan tillgodoses med FreeStyle Libre 1.

I övrigt avstå från Freestyle Libre (1 eller 2) då kostnadseffektivitet ej är visad i andra situationer än ovanstående.

Koppling till nationella och internationella riktlinjer

Utarbetade utifrån:

- NT-rådets yttrande till landstingen gällande ”kontinuerlig glukosmätning med Freestyle Libre vid diabetes typ 2” 2018-02-05
- uppdaterat 2020-08-18 (Medicintekniska produktrådets yttrande till regionerna; inkluderar nu även Freestyle Libre 2)

www.janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik/nyheter/nyheter/mtpradetuppdaterarrekomendationenforfreestylelibre.

Aktuella förskrivare

Lokala rutiner bör skapas på förskrivande enhet.

Förskrivning ska initieras av specialistläkare i diabetologi eller specialist i allmänmedicin med god kunskap om insulinbehandling vid diabetes.

Aktuell patientpopulation

Ett fåtal personer med typ 2 diabetes i Region Skåne bedöms uppfylla ovanstående indikation.

Kostnader

Freestyle Libre 1:

Kostnad för årlig förskrivning/patient är 10 920 kr.

Sensor 420 kr/styck byts var 14:e dag, avläsare/handenhet 599 kr, garantitid 2 år.

Freestyle Libre 2:

Kostnad för årlig förskrivning/patient är 11 636 kr.

Sensor 436 kr/styck byts var 14:e dag, avläsare/handenhet 599 kr, garantitid 2 år.

Implementering av riktlinjerna

Informationsinsatser via Område läkemedel, Koncernkontoret, uppsökande verksamhet

Diabetessamordnarnas nätverk.

Utbildningsbehov kan tillgodoses via diabetessamordnarna, eventuellt med stöd av leverantören enligt avtal.

Uppföljning

Innan FGM (1 eller 2) initieras ska ett tydligt mål för FGM sättas upp tillsammans med patienten

- Har målet inte uppnåtts efter 6 månader, ska FGM (1 eller 2) avslutas och annan provtagningsrutin sättas in.
- **Registrering av FGM 1 och 2 är obligatorisk i NDR**

Tidpunkt för införande

Från och med 2018-03-01, då NT-rådets yttrande samt nytt avtal med leverantören träder i kraft.