

Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2016-12-08 Riktlinjerna giltiga t o m 2017

Insulinordination i läkemedelsmodulen i Melior

Allt insulin skall ordineras i läkemedelsmodulen i Melior.

Insulin ordineras för varje klockslag (=). Eventuell vidbehovsordination skrivs på egen rad.

Tex:

Insulin Humalog antal enheter klockan 8, 12 och 17

Insulin Humalog antal enheter vb, tex 6 vb. Anvisning t.ex: 6E extra till måltid vid blodsocker över 15 mmol/l

Insulin Humulin NPH, antal enheter klockan 12 och klockan 22

Alla blodsocker som tas på avdelningen läggs in i labsvar i Melior. De kan därefter ses i läkemedelsmodulen som mätvärde dag för dag och utgöra underlag för fortsatta insulinordinationer (gå in under Diagram, välj labanalys). Vid blodsocker High skriver man in 25 plus kommentar, annars blir det 0 i modulen.

Vid nyinsättning eller mycket svängande blodsocker är det svårt att se blodsockervärdena på ett bra sätt och man kan skriva blodsocker på pappersdiabeteslistan. Insulin skall ändå ordineras i Melior

Insulinpumpsbehandling: Ordineras som pm. I anvisningsrutan skrivs pump samt tider och doser.

Undantag 1: För barnpatienter med dynamisk insulinordination skrivs i Melior pm-ordination för det insulin som används. Såväl blodsocker och insulindoser registreras på pappersdiabeteslista.

Undantag 2: I öppenvården ordineras insulin som pm.