



Koncernkontoret

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Skapad av	Regionala enheten för läkemedel	Godkänt datum	2026-09-07
Godkänd av	Hälso- och sjukvårdsdirektören	Version	2.6
Gäller för	Utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne	Gäller fr.o.m.	2026-10-01
		Gäller t.o.m.	Ange datum

Regional riktlinje för ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården i Region Skåne

	Giltig fr. o. m.	Giltig t.o.m	Ansvarig samordnare
Ursprunglig version	181206	190207	Frida Furumalm
1.1	190207	191113	Frida Furumalm
1.2	191113	200229	Cecilia Lenander
1.3	200301	200505	Cecilia Lenander
1.4	200505	201217	Cecilia Lenander
1.5	201217	210628	Cecilia Lenander
1.6	210628	220110	Cecilia Lenander
1.7	220110	220630	Cecilia Lenander
1.8	220701	230131	Cecilia Lenander
1.9	230201	230702	Lena Olsson
2.0	230703	240128	Lena Olsson
2.1	240129	240630	Lena Olsson
2.2	240701	240818	Lena Olsson
2.3	240819	250331	Lena Olsson
2.4	250401	250930	Lena Olsson
2.5	251001	260930	Nilla Swärdén
2.6	261001		Nilla Swärdén

Innehåll

Regional riktlinje för ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården i Region Skåne	1
1 Inledning	9
2 Ledningssystem	9
2.1 Ansvar inom verksamhetsområdet	9
2.1.1 Verksamhetschef	9
2.1.2 Regionala Läkemedelsansvariga läkare	10
2.1.3 Lokal Läkemedelsansvarig läkare, eller motsvarande	10
2.1.4 Läkemedelsansvarig sjuksköterska (LASSK)	12
2.1.5 Kontrollansvarig sjuksköterska/farmaceut (KASSK)	13
2.1.6 Gasansvarig	14
2.2 Kvalitetsgranskning	15
2.2.1 Avvikelsehantering	16
3 Behörighet och ansvar	17
3.1 Ansvarsfördelning gällande ordination av läkemedel	18
3.1.1 Ordinator/Förskrivare	18
3.1.2 Sjuksköterska	19
4 Underlag för ordination	19
4.1 Läkemedelsavstämning	19
4.2 Läkemedelsgenomgång	22
4.2.1 Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar	22
4.2.2 Enkel läkemedelsgenomgång	24
4.2.3 Basal läkemedelsgenomgång	24
4.2.4 Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång	24
4.3 Utskrivningsinformation	25
4.3.1 Receptfria läkemedel	26
4.3.2 Särskild landstingssubvention	27

4.3.3 Läkemedel till asylsökande och papperslösa.....	27
4.4 Licensläkemedel	28
4.4.1 Vad är en licens?	28
4.4.2 Märkning och produktinformation	28
4.4.3 Licensansökan	29
4.4.4 Beslut om licens	29
4.4.5 Enskild licens.....	29
4.4.6 Generell licens	29
4.4.7 Dokumentation.....	30
4.5 Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel	31
5 Ordination	32
5.1 Ordinationstyper	32
5.1.1 Stående ordination.....	32
5.1.2 Tillfällig ordination	32
5.1.3 Muntlig ordination	32
5.1.4 Generella direktiv om läkemedelsbehandling	32
5.1.5 Justering av dosering	34
5.1.6 Förskriva naloxon.....	34
5.1.7 Ordination enligt PM.....	35
5.2 Lämplighetsbedömning	35
5.3 Dokumentation av läkemedelsordinationer	36
5.3.1 Innehåll i läkemedelsordination	37
5.3.2 Ordinationsorsak	37
5.3.3 Dokumentation av läkemedelsordinationer vid konsultation	38
5.3.4 Planering av uppföljning eller avslut av läkemedelsordination	38
5.3.5 Doseringsformat	38

5.3.6	Receptförskrivning.....	40
5.3.7	Utbyte av läkemedel på öppenvårdsapotek	40
5.4	Dokumentationssystem för läkemedelsordinationer	40
5.4.1	Dokumentation av läkemedelsordination i primärvård	40
5.4.2	Dokumentation av läkemedelsordination i slutenvård samt öppenvård	41
5.4.3	Dosdispenserade läkemedel för öppenvård	41
5.4.4	Läkemedelsordinationer till barn	43
6	Iordningställande, administrering eller överlämnande av läkemedel	43
6.1	Iordningställande	44
6.1.1	Ostörd hantering	44
6.1.2	Kontroll vid iordningställande	44
6.1.3	Märkning av iordningställda läkemedel.....	45
6.2	Iordningställande av olika läkemedelsformer	46
6.2.1	Injektioner och infusioner	46
6.2.2	Perorala läkemedel	48
6.2.3	Läkemedel via sond	49
6.2.4	Patientindividuellt packade doser (PiD) till sjukhusens vårdavdelningar.....	49
6.2.5	Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt	50
6.2.6	Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter (ATMP) .	51
6.2.7	Medicinska gaser.....	51
6.3	Användningstider för läkemedel.....	51
6.3.1	Brytningsdatum	52
6.4	Dokumentation vid iordningställande av läkemedel	52
6.5	Administrering och överlämnande	53

6.5.1 Kontroll vid administrering eller överlämnande av läkemedel	53
6.5.2 Administrering av parenterala läkemedel	54
6.5.3 Parallellinfusion	55
6.5.4 Administrering av läkemedelsinnehållande plåster	55
6.5.5 Överlämnande av perorala läkemedel	55
6.5.6 Överlämnande – dialog med patient/ närstående	56
6.5.7 Användande av patientens egna läkemedel i slutenvården	56
6.5.8 Patientmedverkan	57
6.6 Dokumentation vid administrering eller överlämnande av läkemedel	60
6.6.1 Dokumentationskrav	60
6.6.2 Läkemedel som får bytas ut	61
6.6.3 Batchnummer	62
6.6.4 Läkemedelsbiverkningar	64
6.6.5 Utökad övervakning	64
6.6.6 Överkänslighet	65
7 Delegering	66
7.1 Delegering betyder att behörig hälso- och sjukvårdspersonal ger någon annan personal rätt att utföra en arbetsuppgift som den annars inte får göra	66
7.2 Ansvar hos den enskilde hälso- och sjukvårdspersonalen gällande kontroll och dokumentation	67
7.3 Vem har behörighet att delegera?	68
7.4 Ansvar på flera nivåer	69
7.4.1 Ansvar för verksamhetschef	69
7.4.2 Ansvar för den person som delegerar	71
7.4.3 Ansvar för mottagare av delegering	72
7.4.4 Sjuksköterska med ansvar för patientens omvårdnad	73

7.5 Delegeringsbeslut – formalia och dokumentation	73
7.6 Delegering av läkemedelshantering mellan personal i olika verksamheter	74
7.7 Läkemedel som ej bör delegeras	74
8 Rekvisition, kontroll och förvaring av läkemedel	75
8.1 Rekvirering av läkemedel	75
8.1.1 Offentlig vård	75
8.1.2 Externa vårdgivare	76
8.1.3 Reservrutin	76
8.1.4 Extempore-läkemedel	76
8.1.5 Rekvisition och lån mellan avdelningar	77
8.1.6 Restnoteringsinformation	77
8.1.7 Rekvisition av licensläkemedel	77
8.1.8 Rekvisition av medicinska gaser	78
8.1.9 Läkemedel för klinisk prövning	79
8.1.10 Antidoter	79
8.2 Mottagning av läkemedelsbeställning	79
8.2.1 Leverans	79
8.2.2 Kontroll av leverans	80
8.3 Returer	81
8.3.1 Indragningar	81
8.3.2 Läkemedel för destruktion	81
8.4 Förvaring av läkemedel	82
8.4.1 Läkemedelsförråd	82
8.4.2 Förvaringsanvisningar för läkemedelsförråd	85
8.4.3 Kassationshantering infusioner	85
8.4.4 Förvaring av medicinska gaser	86
8.4.5 Temperaturmätning	87

8.4.6 Läkemedelsförvaring för enskild patient	88
8.5 Förvaring av läkemedel utanför läkemedelsförråd	89
8.5.1 I vårdsalen	89
8.5.2 Akutvagn/väska/ask	89
8.6 Tillförsel, förbrukning och kassation av narkotiska läkemedel	90
8.6.1 Registrering	90
8.6.2 Förvaring av narkotika	91
8.6.3 Lån mellan enheter	92
8.6.4 Kassation av narkotika.....	94
8.6.5 Narkotikakontroll	95
8.6.6 Hantering av avvikelser	96
9 Hänvisningar	98
10 Bilagor	105

1 Inledning

Den regionala riktlinjen för ordination och hantering av läkemedel i Region Skåne gäller för samtlig hälso- och sjukvårdsverksamhet i Region Skåne.

Verksamhetsanpassningar och ansvarsfördelning ska enligt föreskriften förtydligas i lokala instruktioner och för detta ändamål finns regionala stödmallar framtagna. I bilaga 1–18 finns uppdragsbeskrivningar, checklistor och mall till lokala instruktioner. Olika stödmallar kan bli aktuella att använda och vid behov anpassas beroende på verksamhetens uppdrag.

2 Ledningssystem

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att Vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten samt säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår extern kvalitetsgranskning.

2.1 Ansvar inom verksamhetsområdet

Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för verksamheten. I de fall verksamhetschefen inte är läkare, ska denne uppdra åt annan med rätt kompetens att fullgöra viss ledningsuppgift och ska dessutom bevaka att denna uppgift fullgörs på ett tillfredställande sätt. Se regionala mallar för uppdragsbeskrivningar, bilaga 1–7, 10, 17 samt mall för lokala instruktioner, bilaga 15/16.

2.1.1 Verksamhetschef

Verksamhetschefens ansvar gällande läkemedelshantering är att:

- tillse att det finns ett entydigt fördelat ansvar för ordination och hantering av läkemedel inom verksamhetsområdet. Ansvarsfördelningen ska vara dokumenterad i en lokal instruktion.
- säkerställa att Region Skånes regiongemensamma riktlinje för ordination och hantering av läkemedel samt lokala instruktioner finns tillgängliga, är kända och efterlevs av berörda medarbetare.

Exempel:

- Funktionerna Läkemedelsansvarig läkare och Läkemedelsansvarig sjuksköterska ska finnas inom verksamheten.
- Tydliga instruktioner ska finnas för den personal som iordningställer läkemedel som ska spädas.
- Fastställa och göra den regionala utbyteslistan känd i verksamheten.
- Efterlevnad av verksamhetens lokala instruktion gällande märkning av iordningställda läkemedel.
- Beslutsstöd för ordinationer ska finnas, till exempel ePed för de som ordinerar och iordningställer läkemedel till barn.
- Tillse att uppföljning av ordinerade läkemedelsbehandlingar görs.
- Fatta beslut om i vilken utsträckning ordination enligt generella direktiv ska förekomma och säkerställa att de omprövas regelbundet.
- Säkerställa att den sjuksköterska som får dosjustera läkemedel enligt särskilt förordnande har adekvat kompetens för uppgiften.
- Tillse att delegering av läkemedelshantering sker på ett korrekt och patientsäkert sätt inom verksamhetsområdet.

Läs mer: [Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete \(SOSFS 2011:9\)](#)

Bilaga 1: Uppdrag ledningsuppgift ansvar för läkemedelshantering.

2.1.2 Regionala Läkemedelsansvariga läkare

Läkemedelsansvariga läkare på regional nivå har ansvar och arbetsuppgifter reglerade enligt Läkemedelsrådets reglemente.

Läs mer: [Läkemedelsrådets reglemente](#) (se Styrdokument)

2.1.3 Lokal Läkemedelsansvarig läkare, eller motsvarande

Lokal läkemedelsansvarig läkare eller motsvarande ansvarar för att:

- verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

- verka för att regelverk och Läkemedelsrådets rekommendationer samt utbyteslista är kända och i största mån efterlevs.
- anpassa lokala instruktioner för läkemedelshantering (ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel) som komplement till Regiongemensam riktlinje för ordination och hantering av läkemedel.
- medverka till att lokala instruktioner avseende läkemedel samt generella direktiv om läkemedelsbehandling uppdateras årligen.
- verka för att styrande dokument för läkemedelshantering och läkemedelsdokumentation blir kända och följs av berörd personal.
- samverka med enhetens läkemedelsansvariga sjuksköterska för att samordna riktlinjer och rutiner och åstadkomma förbättrad läkemedelsanvändning i alla moment inklusive beställning, ordination, iordningställande/administration, läkemedelsdokumentation, uppföljning och läkemedelsinformation.
- minst en gång årligen i samverkan med läkemedelsansvarig sjuksköterska och eventuell kontaktperson för Läkemedelsservice uppdatera bassortimentet av läkemedel. Detta ska även ske i samband med uppdaterad utbyteslista samt vid nya upphandlingar.
- delta i eventuella nätverk för läkemedelsansvariga läkare.
- tillsammans med huvudkontaktperson för Melior/PMO/Orbit/motsvarande tillse att nyheter i läkemedelsmodulen i respektive system blir kända och efterlevs av användarna.
- vara rådgivande och handleda medarbetare samt följa upp brister i läkemedelshanteringen och dokumentationen.
- uppmuntra och stödja biverkningsrapportering och avvikelserapportering inom läkemedelsområdet samt följa upp och föreslå säkerhetshöjande åtgärder.
- följa upp förbruknings- och förskrivningsstatistik i förhållande till regionala rekommendationer.
- medverka vid årlig kvalitetsgranskning/egenkontroll av läkemedelshanteringen och läkemedelsdokumentationen.

Läs mer: Bilaga 2: Uppdrag och funktionsbeskrivning läkemedelsansvarig läkare.
Kvalitetsgranskningsmodellen, hänvisning till 2.2.

2.1.4 Läkemedelsansvarig sjuksköterska (LASSK)

LASSK ska registreras som kontaktperson ”Läkemedelsansvarig-ssk-kontakt” i Skånekatalogen för den enhet som LASSK-uppdraget avser. Om en medarbetare har ett LASSK-uppdrag för flera enheter så ska vederbörande registreras som kontaktperson för varje enhet som uppdraget innefattar. Registrering görs av enhetens katalogadministratör för Skånekatalogen.

Läkemedelsansvarig sjuksköterska ansvarar för att:

- verka för en säker och effektiv läkemedelsanvändning.
- verka för att regelverk och Läkemedelsrådets rekommendationer samt utbyteslista är kända och i största mån efterlevs.
- verka för att styrande dokument för läkemedelshantering och läkemedelsdokumentation blir kända och följs av enhetens sjuksköterskor samt av annan berörd personal.
- samverka med enhetens läkemedelsansvariga läkare för att samordna riktlinjer och rutiner och åstadkomma förbättrad läkemedelsanvändning i alla moment inklusive beställning, ordination, iordningställande/administration, läkemedelsdokumentation, uppföljning och läkemedelsinformation.
- medverka till att lokala instruktioner avseende läkemedel samt generella direktiv om läkemedelsbehandling uppdateras årligen.
- tillse att indragningsskrivelserna och meddelanden från läkemedelsleverantören åtgärdas.
- ordningen i läkemedelsrummet säkerställs.
- tillse att det finns rutiner för att lämna överblivna läkemedel till svansförråd/serviceförråd.
- minst en gång årligen i samverkan med läkemedelsansvarig läkare eller motsvarande och eventuell kontaktperson för Läkemedelsservice, uppdatera bassortimentet av läkemedel och sortimentet i vätskevagnar. Uppdatering är särskilt viktigt

i samband med uppdaterad utbyteslista samt vid nya upphandlingar.

- delta i lokala möten för läkemedelsansvariga sjuksköterskor/farmaceuter samt föra informationen vidare till enhetens sjuksköterskor.
- vara rådgivande och handleda medarbetare samt följa upp brister i läkemedelshanteringen och dokumentationen.
- delta i introduktionen av nyanställda avseende läkemedelshantering och läkemedelsdokumentation.
- tillsammans med huvudkontaktperson för Melior/PMO/Orbit/motsvarande tillse att nyheter i läkemedelsmodulen i respektive system blir kända och efterlevs av användarna.
- uppmuntra och stödja biverkningsrapportering och avvikelserapportering inom läkemedelsområdet samt följa upp och föreslå säkerhetshöjande åtgärder.
- medverka i den årliga kvalitetsgranskningen/egenkontroll av läkemedelshanteringen och läkemedelsdokumentationen.

Läs mer: Bilaga 3, Uppdrag och funktionsbeskrivning läkemedelsansvarig sjuksköterska.
Kvalitetsgranskningsmodellen, hänvisning till 2.2.

2.1.5 Kontrollansvarig sjuksköterska/farmaceut (KASSK)

KASSK ska registreras som kontaktperson ”Kontrollansvarig-ssk-kontakt” i Skånekatalogen för den enhet som KASSK-uppdraget avser. Om en medarbetare har ett KASSK-uppdrag för flera enheter så ska vederbörande registreras som kontaktperson på varje enhet som uppdraget innefattar. Registrering görs av enhetens katalogadministratör för Skånekatalogen. Underskrivet beslut ska finnas innan registrering i Skånekatalogen sker.

Kontrollansvarig sjuksköterska/farmaceut ansvarar för att:

- verka för en säker och effektiv narkotikahantering.
- delta i lokala möten för kontrollansvariga sjuksköterskor/farmaceuter samt föra informationen vidare till enhetens sjuksköterskor.

- vara rådgivande för och handleda medarbetare samt följa upp brister i narkotikahanteringen och dokumentationen.
- i möjligaste mån medverka i den årliga kvalitetsgranskningen/egenkontrollen av läkemedelshanteringen och läkemedelsdokumentationen.
- kontrollera samtliga lagersaldon mot förbrukningsjournal, minst en gång per månad, oftare vid behov exempelvis vid saldoavvikelse som föranleder misstanke om oegentligheter.
- kontrollera anteckning i förbrukningsjournal mot ordination i ordinationssystemet/motsvarande.
- kontrollera införsel i förbrukningsjournal mot beställning gjord i Raindance marknadsplatsen.
- kontrollera införsel och utförsel i förbrukningsjournal mot "Blankett vid utlåning av narkotika" om lån från eller till annan enhet har förekommit.
- kontrollera hur eventuell kassation av större mängd narkotika dokumenterats i förbrukningsjournal (till exempel vid utgången hållbarhet). Dubbelsignering krävs.
- följa upp och rapportera till enhetschef om det förekommer saldoavvikelser eller andra avvikelser sedan föregående narkotikakontroll.

Läs mer: Bilaga 4: Uppdrag och funktionsbeskrivning kontrollansvarig sjuksköterska, samt bilaga 4a: Checklista för kontroll och inventering av narkotika.

2.1.6 Gasansvarig

Gasansvarig ansvarar för att:

- Tillsammans med verksamhetschef (eller av denne utsedd) bidra till att de lokala rutinerna kring gashanteringen finns, är relevanta och är uppdaterade.
- Tillse att rekvirering och mottagningsförfarande sker enligt godkänd rutin.
- Ha kännedom om det fastställda gassortimentet på enheten.
- Tillsammans med verksamhetschef (eller av denne utsedd) vid behov delta i riskbedömning av gashanteringen på enheten.
- Tillsammans med verksamhetschef (eller av denne utsedd) säkerställa att personal har erforderlig utbildning i medicinska gaser.

- Bidra till att rutiner kring gashantering är kända och följs på enheten.
- Ha kunskap om den rutin som gäller vid driftsstörning eller gasbortfall.
- Ha kunskap om den rutin som gäller vid brand eller nödsituation.

Läs mer: Bilaga 5: Uppdrag och ansvarsbeskrivning gasansvarig, samt bilaga 5a: Förvaring och kontroll av medicinsk gasflaska på enhet.

2.2 Kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs för att uppnå god kvalitet och säkerhet i läkemedelshanteringen.

Kvalitetsgranskningar i Region Skåne genomförs i egen regi. Förvaltningarna och privata vårdaktörer ansvarar själva för att genomföra dessa.

Läs mer: [Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering](#)

2.2.1 Avvikelsehantering

Samtliga avvikelser rörande läkemedel rapporteras i Region Skånes avvikelssystem.

Detta innebär att även Region Skånes leverantör av läkemedel kan rapportera, orsaksutreda med mera via avvikelssystemet.

Avvikelser som avser läkemedelstjänster som tillhandahålls av läkemedelsleverantören ska rapporteras i flödet "leveranser och tjänster", för att inte förväxlas med läkemedelshantering som till exempel feldosering, feladministrering vilka är händelser som hör till flödet "patientärende". Avvikelser som rör misstänkt eller konstaterat svinn/stöld av narkotika ska kategoriseras som "Säkerhet".

Observera att även avvikelser från extern vårdgivare ska registreras i avvikelssystemet av den som tar emot informationen. Dokument från extern vårdgivare gällande avvikelser bifogas då.

3 Behörighet och ansvar

Nedanstående tabell beskriver vilka yrkeskategorier inom svensk hälso- och sjukvård som har behörighet att ordinera/förskriva, iordningställa, administrera och överlämna läkemedel.

Läs mer: [HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården](#)

Tabell 1 Behörighet för hälso-och sjukvårdspersonal enligt HSLF- FS 2017:37

Yrkestitel	Ordinera/ förskriva	Iordningställa	Administrera	Överlämna
Läkare	Ja	Ja	Ja	Ja
Tandläkare	Ja, inom kompetens-området	Ja	Ja	Ja
Sjuksköterskor	Ja, särskild behörighet	Ja	Ja	Ja
Fysioterapeuter	Nej	Ja, i samband med fysioterapi	Ja, i samband med fysioterapi	Ja, i samband med fysioterapi
Sjukhusfysiker	Nej	Ja, radioaktiva läkemedel	Nej	Ja, radioaktiva perorala läkemedel
Biomedicinska analytiker	Nej	Ja, inom kompetens-området	Ja, inom kompetens-området	Ja, inom kompetens-området
Tandhygienister	Ja, inom kompetens-området	Ja, inom kompetens-området	Ja, inom kompetens-området	Ja, inom kompetens-området
Röntgen sjuksköterskor	Nej	Ja, inom kompetens-området	Ja, inom kompetens-området	Ja, inom kompetens-området
Barnmorskor som ej är sjuksköterskor	Nej	Ja, inom kompetens-området	Ja, inom kompetens-området	Ja, inom kompetens-området
Apotekare	Nej	Ja	Nej	Ja
Receptarier	Nej	Ja ¹	Nej	Ja
Optiker	Ja, inom kompetens-området	Ja, med begränsningar	Ja, med begränsningar	Ja, med begränsningar
Sjuksköterske studenter	Nej	Ja, under tillsyn av legitimerad personal ²	Ja, under tillsyn av legitimerad personal ²	Ja, under tillsyn av legitimerad personal ²
Icke-legitimerade inom ambulans-sjukvård och räddningstjänst	Nej	Ja, andningsoxygen enligt generellt direktiv	Ja, andningsoxygen enligt generellt direktiv	Nej

¹ Utbildningens innehåll kan variera och inkluderar nödvändigtvis inte praktik, kunskap och erfarenhet inom området.

² Studentens handledare kan inte avsäga sig ansvaret vid eventuellt uppkomna misstag.

3.1 Ansvarsfördelning gällande ordination av läkemedel

3.1.1 Ordinator/Förskrivare

Vid ordination av läkemedel ansvarar ordinator/förskrivare för att:

- ha kännedom om verksamhetens styrande dokument för läkemedelsordination och hantering.
- vara restriktiv med muntliga ordinationer och enbart använda detta när det krävs omedelbar behandling.
- känna till verksamhetens generella direktiv om läkemedelsbehandling och vara uppmärksam på varför ett förändrat behov uppstått samt om läkemedel givna enligt generella direktiv bör ordinerats som stående- eller vid behovsordination på grund av bestående förändring i patientens behov.
- göra en läkemedelsavstämning tillsammans med patienten för att komplettera och uppdatera uppgifterna i journalens läkemedelslista, hänvisning till [4.1](#).
- vara medveten om att dosjusteringar kan ha utförts av sjuksköterska som har ett särskilt förordnande att dosjustera specificerade läkemedel mot målvärde enligt verksamhetens rutiner, exempel på detta kan vara insuliner, antikoagulantia, diuretika.
- göra en lämplighetsbedömning utifrån patientens behov, detta gäller både vid in- och utsättning av läkemedel, ändring eller förlängning av en ordination och är viktigt att tänka på vid receptförnyelse.
- åtgärda läkemedelsordination som uppenbart inte är ändamålsenlig och säker och som upptäcks vid läkemedelsavstämningen, hänvisning till [4.1](#).
- dokumentera läkemedelsordinationer i patientjournalen på ett strukturerat sätt i enlighet med gällande rutiner.
- alltid ange ordinationsorsak tillsammans med den aktuella ordinationen.
- i samråd med patienten planera en tidpunkt för när läkemedelsbehandlingen ska följas upp eller avslutas.
- informera patienten om att ett läkemedel kan komma att bytas ut mot ett likvärdigt läkemedel på ett öppenvårdsapotek vid receptförskrivning.

3.1.2 Sjuksköterska

Vid hantering av läkemedelsordination ansvarar sjuksköterska för att:

- ha kännedom om verksamhetens styrande dokument för läkemedelsordination, läkemedelsdokumentation och hantering.
- göra en behovsbedömning och bedöma läkemedlets indikation och kontraindikation innan överlämning eller administrering av läkemedel enligt generella direktiv, behovsbedömningen ska dokumenteras.
- dokumentera en muntlig ordination om ordinatören är förhindrad att göra det själv.
- vara medveten om att sjuksköterska kan ha ett personligt förordnande att dosjustera specificerade läkemedel mot målvärde enligt verksamhetens rutiner, exempel på detta kan vara insuliner, antikoagulantia, diuretika.

4 Underlag för ordination

Ordination innebär beslut av hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Den vård och behandling som en patient får ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, och så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Den som ska ordinera, iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel måste ha tillgång till en samlad information kring patientens läkemedelsordinationer.

4.1 Läkemedelsavstämning

En korrekt och uppdaterad läkemedelslista är en grundförutsättning för att kunna bedöma patientens tillstånd och behandlingseffekter, risker med behandlingen samt biverkningar.

Läkemedelsavstämningen syftar till att säkerställa en aktuell läkemedelslista.

Läkemedelsavstämning genomförs vid

- inskrivning i slutenvård
- påbörjad hemsjukvård
- inflyttning i en sådan boendeform eller bostad omfattandes av 12 kap 1§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
- besök hos läkare i öppenvård då läkemedelsförändringar genomförs, ex insättning och avslutande av behandling, justering av dos.

Informationsruta 1

Vid läkemedelsavstämningen kartläggs:

1. de ordinerade läkemedel som patienten använder samt ordinationsorsak.
2. övriga läkemedel, exempelvis receptfria läkemedel (obs NSAID³!) och naturläkemedel.

Öppenvård: Den som ordinerar läkemedel ansvarar för att läkemedelsavstämning genomförs och för att patienten, eller närstående, får en uppdaterad läkemedelslista. Observera att samtycke krävs från patienten om närstående ska ta del av listan i enlighet med patientlagen. I mottagningsanteckningen dokumenteras om och hur läkemedelsavstämning har genomförts, vilka källor som använts samt att uppdaterad läkemedelslista har lämnats ut.

³ Exempel på generiska substansnamn: Ibuprofen, Naproxen.

Uppdatera aktuella ordinationer (specialistmottagning/ Melior) alternativt läkemedelslistan (primärvård/PMO). Använd sökord "Läkemedelsavstämning, slutförd" för Melior respektive "Läkemedelsavstämning, källor" för PMO. Patienten kan som alternativ till läkemedelsavstämning på specialistmottagning i öppenvård erbjudas remiss för avstämning hos den vårdenhets som har den huvudsakliga vårdkontakten. Den som ordinerar ett läkemedel eller ändrar pågående ordination har dock ett ansvar för att ordination är lämplig både utifrån patientens hälsotillstånd, övriga läkemedel samt annan pågående behandling eller utredning.

Slutenvård/Psykiatrisk heldygnsvård:

Läkemedelsavstämningen ska påbörjas snarast men bör slutföras senast under första vårddygnet. Stäm av information med patient eller den som hanterar patientens läkemedel. Uppdatera aktuella ordinationer/ordinationsöversikten enligt avstämd läkemedelslista. Dokumentera i journalen att en läkemedelsavstämning gjorts, vilka källor som använts och om oklarheter kvarstår. Använd sökord "Läkemedelsavstämning slutförd". Dokumentation görs enligt [Läkemedelsavstämning steg för steg i Melior](#). Ansvarig läkare på den avdelning där patienten vårdas har huvudansvaret för att läkemedelsavstämningen genomförs och att läkemedelslistan i journalsystemet uppdateras.

Läs mer:

[Läkemedelssäkerhet](#)

[Läkemedelsavstämning - Vårdgivare Skåne](#)

Här finns länkar till bland annat:

- [Lathund: "Koll på Läkemedelslistan i PMO"](#).
- [Lathund: "Koll på läkemedelslistan i Melior"](#).
- [Lathund "Läkemedelsavstämning steg för steg i Melior"](#).
- [Filmer: Läkemedelsavstämning i öppenvården respektive slutenvården](#).
- [Regionala riktlinjer för läkemedelsavstämning](#)

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)

[Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO och Manual för läkemedelsavstämning \(under Läkemedel - Manualer\)](#)

4.2 Läkemedelsgenomgång

En läkemedelsgenomgång är en metod för analys, uppföljning och omprövning av en individs läkemedelsanvändning, som genomförs enligt ett förutbestämt strukturerat och systematiskt arbetssätt, i enlighet med lokala riktlinjer och rutiner.

Det övergripande syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen.

Vårdenhet som i sin verksamhet har läkare anställda eller har läkare som arbetar där på uppdrag eller annan liknande grund har skyldighet att erbjuda läkemedelsgenomgångar.

En läkemedelsgenomgång ska resultera i:

- en optimering av patientens läkemedelsbehandling.
- en individuellt anpassad information till patienten om vilka åtgärder som har vidtagits, orsaker till åtgärderna, mål med läkemedelsbehandlingen och planerad uppföljning.
- en uppdaterad läkemedelslista till patienten.

Informationsruta 2

4.2.1 Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar

I Region Skåne är det beslutat att läkemedelsgenomgångar ska genomföras i enlighet med Skånemodell för läkemedelsgenomgångar.

Enligt Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar genomförs läkemedelsgenomgångar på tre nivåer; Enkel läkemedelsgenomgång, Basal läkemedelsgenomgång respektive Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång.

En läkemedelsgenomgång består av följande delar:

- **Faktainsamling**
Aktuell läkemedelslista via läkemedelsavstämning, diagnoser, symtom, följsamhet, mätvärden t. ex. blodtryck, njurfunktion.
- **Ställningstagande**
Aktuell indikation, effekt, biverkningar, olämpliga läkemedel, dos anpassad till patient, interaktioner.
- **Dokumentation**
Identifierade problem relaterade till läkemedelsbehandlingen samt förslag på åtgärder dokumenteras.
- **Åtgärdsplan**
Upprättande av beslut och åtgärdsplan.
- **Utvärdering**
Utvärdering av genomförd förändring enligt åtgärdsplan.

Informationsruta 3

Läkaren ansvarar för att patienten får individuellt anpassad information om vilka åtgärder som har vidtagits och orsaker till åtgärderna samt att patienten får en uppdaterad läkemedelslista.

4.2.2 Enkel läkemedelsgenomgång

En enkel läkemedelsgenomgång utgår från en läkemedelsavstämning och säkerställer därtill att läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. Är patientansvarig läkares ansvar och ska genomföras vid vårdens övergångar, till exempel vid inskrivning på sjukhus.

4.2.3 Basal läkemedelsgenomgång

En basal läkemedelsgenomgång bör erbjudas patienter 65 år eller äldre vid årskontroll samt vid misstanke om läkemedelsrelaterat problem (LRP) i akut situation.

Läs mer: [Metodstöd Basal läkemedelsgenomgång](#)

4.2.4 Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång ska erbjudas patientgrupper som löper störst risk för läkemedelsrelaterade problem och läkemedelsorsakade sjukhusinläggningar.

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång enligt Skånemodellen bör genomföras för nedanstående patientgrupper:

- Flyttar in på särskilt boende.
- Skrivs in i kommunal hemsjukvård.
- Övergår till dosdispenserade läkemedel.
- Har kvarvarande läkemedelsrelaterade problem efter enkel eller basal läkemedelsgenomgång.
- Ingår i särskilda/prioriterade grupper enligt lokala instruktioner.

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång genomförs av ansvarig läkare i samarbete med apotekare eller geriatriker alternativt läkare med en närliggande specialitet certifierad för att göra läkemedelsgenomgångar.

Läs mer: Föreskrifter och regionala/nationella dokument som reglerar arbetet.

[HSLF-FS 2017:37 kapitel 11 Läkemedelsgenomgångar](#)

[Modell för Läkemedelsgenomgångar i Skåne](#)

[Läkemedelsgenomgång - Vårdgivare Skåne](#)

Metodstöd:

[God läkemedelsbehandling till äldre](#)

4.3 Utskrivningsinformation

Misstag och missuppfattningar är vanliga i samband med utskrivning från sjukhus, bland annat om läkemedelsanvändning.

Utskrivningsinformation syftar till att säkerställa att information vid utskrivning överförs korrekt till patient och till nästa vårdform.

Utskrivningsinformation ska skrivas när patienter skrivs ut från sjukhusvård.

Följande information ska framgå i utskrivningsinformationen:

- Kortfattad information kring inläggningsorsak, vad som gjorts under vårdtiden samt vad som planeras efter vårdtiden, exempelvis provtagning, återbesök, sjukskrivning.
- Läkemedelsberättelse; vilka läkemedelsförändringar som skett under vårdtiden och varför.
- En aktuell läkemedelslista; information om läkemedelsnamn, beredningsform, styrka, dosering och indikation samt om behov föreligger administreringsätt och behandlingstid.

Informationsruta 4

Läkare på utskrivande avdelning ansvarar för att utskrivningsinformationen är aktuell, för att muntligen gå igenom och överlämna en skriftlig individanpassad utskrivningsinformation till patienten, eller närstående. Informationen ska även överföras till nästa vårdenhhet, ex VC, *kommun senast samma dag* om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar. Verksamhetschef säkerställer att det finns lokala rutiner för att information överförs till nästa vårdenhhet. För dospatienter ansvarar läkare på utskrivande avdelning även för att föra in läkemedelsförändringar i Pascal. Patienten ska föras med läkemedel som räcker tills dosdispenserade läkemedel kan levereras. Se även 6.5.8.4 [Jourdos](#).

Av verksamhetschef utsedd funktion, exempelvis medicinsk sekreterare, dokumenterar i patientens journal Melior till vilken/vilka vårdenheter utskrivningsinformationen har skickats.

I journalen skall även målen för läkemedelsbehandlingen, när uppföljning av behandlingen ska göras och vilken vårdenhhet som ska ansvara för uppföljningen dokumenteras.

Läs mer:

[Läkemedelssäkerhet](#)

[Utskrivningsinformation - Vårdgivare Skåne](#)

[Patientsäkerhetslag SFS 2010:659, §6](#)

[Lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård, SFS 2017:612](#)

[SOSFS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.](#)

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)

[Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO \(under Läkemedel - Manualer\)](#)

[Läkemedelsavstämning - Vårdgivare Skåne](#)

Här finns länkar till bland annat:

- [Lathund: "Koll på Läkemedelslistan i PMO".](#)
- [Lathund: "Koll på läkemedelslistan i Melior".](#)

Läkemedelsrekommendationer

Läkemedelsrådets rekommendationer samt de rekvisitionsläkemedel som upphandlats till särskilda avtalspriser av Koncerninköp, anger vilka läkemedel som i första hand ska användas inom Region Skåne.

Läs mer:

[Skånelistan](#)

[Avtalade läkemedel](#)

[Utbyteslista](#)

[Sortimentslista Patientindividuellt packade doser](#)

4.3.1 Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel kan förskrivas på recept. Ett fåtal receptfria läkemedel ingår i läkemedelsförmånen, vilket innebär att läkemedlet räknas till patientens högkostnadsskydd om läkaren markerar detta vid förskrivningstillfället.

Läkemedelsrådet i Region Skåne har fastställt övergripande principer för receptförskrivning alternativt egenvård. Om patienten har ett medicinskt behov av ett receptfritt läkemedel bör läkaren ta ställning till behandlingen och utfärda ett recept om detta är lämpligt.

Vid behov av kortvariga behandlingar under 2 – 3 månader rekommenderar Läkemedelsrådet egenvård efter en individuell bedömning, vilket i många fall blir enklare för patienten och för sjukvården. Bedömningen ska inte påverkas av om patienten har frikort, eller om det rör sig om ett barn med kostnadsfria läkemedel.

Läs mer: [Receptfritt på apotek - egenvårdshänvisningar \(under Rekommendationslistor\)](#)

4.3.2 Särskild landstingssubvention

Förskrivningar till patient på recept eller hjälpmedelskort av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av högkostnadsskyddet. Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Även i andra fall kan det hända att patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor.

För att förskrivningen ska kunna omfattas av Region Skånes särskilda subventioner, för personer folkbokförda i Skåne, måste förskrivningsdokumentet respektive fakturaunderlaget omfatta specifik information.

Följande områden är aktuella för särskild landstingssubvention:

- Undantagshantering för läkemedel utanför förmånen.
- Preventivmedel till ungdomar ("ungdomsrabatt").
- Spolvätskor på recept (tidigare kallade CE-produkter).
- Smittskyddsläkemedel.
- Antipsykotiska läkemedel till vissa patienter.
- Tidigareläggning av läkemedelsinköp vid resa utomlands.

Informationsruta 5

Läs mer: [Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention](#)

4.3.3 Läkemedel till asylsökande och papperslösa

För asylsökande och papperslösa gäller särskilda regler gällande läkemedelsförskrivning.

Läs mer nedan om vilka läkemedel som subventioneras och hur du som hälso- och sjukvårdspersonal går tillväga för att förskriva läkemedel till asylsökande och papperslösa.

Läs mer: [Vård av personer från andra länder](#) (se Läkemedel under asylsökande respektive papperslösa).

4.4 Licensläkemedel

4.4.1 Vad är en licens?

Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. Ett icke-godkänt läkemedel får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket beviljat tillstånd till detta, dvs. apoteket har erhållit en beviljad licens.

4.4.2 Märkning och produktinformation

Det är viktigt att utförlig dokumentation avseende licensläkemedel finns tillgänglig vid såväl sluten- som öppenvård samt att denna information vidarebefordras vid överföring till annan vårdenhet. Eftersom licensläkemedel inte är godkända i Sverige, finns inte heller viktig dokumentation kring dessa preparats indikationer, dosering, biverkningar och interaktioner med mera tillgängliga i FASS. Interaktionsvarning relaterat till licensläkemedel finns därför inte i Melior och PMO.

Läkemedel som inte innehar godkännande i Sverige är inte granskade av Läkemedelsverket. Märkning, produktinformation och förpackning är enligt det språk som förekommer i det land där läkemedlet har godkännande. Viss vägledande information finns framtagen för utvalda licensläkemedel, se länk nedan under "Läs mer".

4.4.3 Licensansökan

Licensansökningar görs via e-hälsomyndighetens system Kommunikationslösning för licensansökan (KLAS). I KLAS kan förskrivare skapa och komplettera licensmotiveringar för läkemedel. Förskrivaren har ansvar för att doseringen är medicinskt ändamålsenlig, för att information till patienten ges, samt för att behandlingen följs upp på lämpligt sätt och att eventuella biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket. Det går att ange vilket apotek som licensen önskas till i motiveringen men det är inte obligatoriskt. Det är inte heller obligatoriskt för valt apotek att behandla licensansökan innan patienten har besökt apoteket. Patienter får hämta ut sina licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek oavsett vilken apotekskedja som har beviljats licensen. För hantering av licens för rekvisitionsläkemedel, hänvisning till [8.1.7](#).

Läs mer: [Förskrivning av licensläkemedel i Melior](#).

4.4.4 Beslut om licens

Läkemedelsverkets beslut om beviljad licens meddelas apoteket. Förskrivaren får ingen bekräftelse, men kontaktas av Läkemedelsverket vid avslag eller om motiveringen behöver kompletteras. Beviljad licens avser en viss behandlingstid eller mängd. En licens är giltig i ett år från dagen för beslutet, om inte Läkemedelsverket anger en kortare tid.

4.4.5 Enskild licens

Enskild licens avser licensläkemedel för en enskild patient. Licensläkemedel för en enskild patient finns i de flesta fall namngivna med produktnamn i Melior under "Icke godkända" läkemedel. Produktnamnen används också vid elektronisk förskrivning av ett licensläkemedel. Ordinerade licensläkemedel dokumenteras i Melior/PMO. Bipacksedeln bör när det är möjligt skannas in i journalen.

4.4.6 Generell licens

Generell licens kan ges för rekvisitionsläkemedel och kan gälla för en hel vårdenhet eller för ett helt sjukhus. För ett läkemedel med bred användning, där det finns en bristsituation, kan det vara bra med en generell licens som gäller hela sjukhusets behov.

Förskrivaren ska då ha kunskaper om och insyn i vården på hela sjukhuset för att licensen ska bli godkänd. Det bör anges vilken befattning och vilket ansvarsområde förskrivaren som skickat in licensmotiveringen har. För att söka licens för ett helt sjukhus kan en lämplig befattning vara chefläkare.

För ett läkemedel där det finns flera godkända alternativ och läkemedlet bara används i undantagsfall kan man söka licens till en mindre enhet. Då ska förskrivaren ha god kunskap om och insyn i den vård som bedrivs vid den vårdinrättning eller de vårdinrättningar som anges i den generella licensansökan.

Regionövergripande licens är en generell licens som godkänns tillfälligt för hela regionen, vid till exempel omfattande restsituationer av specifikt, vanligt förekommenade läkemedel.

4.4.7 Dokumentation

Eftersom licensläkemedel saknar text i FASS är det viktigt att personal som administrerar ett licensläkemedel har god kunskap om läkemedlet och därför bör licensläkemedel som används kontinuerligt på en avdelning/mottagning finnas med i den "Lokala instruktionen för läkemedelshantering".

Behandlande läkare ansvarar för att det finns en tydlig anvisning i ordinationen så att sjuksköterskan som hanterar licensläkemedlet vet hur det ska iordningställas och administreras.

Vid överföring till annan vårdenhet ska licensinformationen dokumenteras. Vid överföring till öppenvård ska dokumentation medfölja remiss eller remissvar till såväl remitterande som patientens läkare i primärvården.

Läs mer:

Se mer om rekvisition av licensläkemedel hänvisning [8.1.7](#)

[Licensläkemedel - Vårdgivare Skåne \(samlingssida kring licensläkemedel\)](#)

[Nationellt produkt- och artikelregister VARA](#)

För dokumentation gällande licensläkemedel se:

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)

[Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO \(under Läkemedel - Manualer\)](#)

Bilaga 15: Lokal instruktion för läkemedelshantering slutenvård och specialistvård - Revidering pågår.

Bilaga 16: Lokal instruktion för läkemedelshantering primärvård -
Revidering pågår.

4.5 Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel

Växtbaserade läkemedel kan ordineras/rekommenderas som
”vanliga” läkemedel av legitimerad personal.

Traditionella växtbaserade läkemedel har ett mycket begränsat
vetenskapligt underlag gällande effekt och säkerhet. Legitimerad
personal bör inta en mer restriktiv hållning.

Naturläkemedel har godkänts av Läkemedelsverket i enlighet med
gällande lagstiftning. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan
förskriva/rekommendera naturläkemedel inom ramen för sin
yrkeskompetens. Notera att interaktioner med läkemedel kan
förekomma vid användning av vissa naturläkemedel/växtbaserade
läkemedel, vilket kan leda till potentiellt skadliga effekter.

Rekommendation av naturläkemedel/växtbaserade läkemedel ska
journalföras på samma sätt som receptfria läkemedel.

En aktuell förteckning över idag godkända
naturläkemedel/växtbaserade läkemedel, med godkända indikationer
och övrig produktinformation (produktresuméer) finns på
Läkemedelsverkets hemsida.

Läs mer:

[Janusmed interaktioner och riskprofil](#)

[Om rekommendationer och förskrivning, Läkemedelsboken](#)

[Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel, Läkemedelsverket](#)

5 Ordination

5.1 Ordinationstyper

5.1.1 Stående ordination

Stående ordination kan ges som:

- kontinuerlig ordination.
- vidbehovsordination.

5.1.2 Tillfällig ordination

Med tillfällig ordination avses läkemedel som ges vid ett enstaka behandlingstillfälle. Detta i motsats till vidbehovsordination som ordinerats i förväg och avser en planerad behandling. Uppgift om behandlingsperiod ska dokumenteras i journalsystemens läkemedelsmodul.

5.1.3 Muntlig ordination

För att en ordination ska vara patientsäker, får muntlig ordination enbart ske när en patient behöver omedelbar behandling.

Sjuksköterska som tar emot ordinationen repeterar denna.

Ordinationen ska dokumenteras direkt eller i undantagsfall så snart som möjligt av den som ordinerat.

I de fall där den som ordinerat inte kan dokumentera ordinationen, ska sjuksköterskan skriva in ordinationen i Läkemedelsmodulen (Melior) eller i journalen (PMO) som en tillfällig ordination i ansvarig läkares namn.

5.1.4 Generella direktiv om läkemedelsbehandling

Generella direktiv om läkemedelsbehandling är ett beslut om läkemedelsbehandling som gäller patienter på en viss vårdenhets och vid särskilt angivna tillstånd. Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling. Denna typ av ordinationer ska utfärdas restriktivt och omprövas regelbundet. De generella direktiven ska uppdateras minst en gång årligen.

Anvisningar för ordinationer enligt generella direktiv ska finnas i den lokala instruktionen för läkemedelshantering. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en bedömning av patientens behov samt kontrollerat läkemedlets indikation och kontraindikation.

Sjuksköterska ska även uppmärksamma angiven maxdos och kontrollera hur många doser som får ges utan läkarkontakt.

Ordinationer enligt generella direktiv dokumenteras i läkemedelsmodulen i Melior. Behovsbedömningen dokumenteras i utdelningskommentaren i utdelningslistan. När det gäller primärvårdens generella direktiv för hemsjukvården dokumenteras det i kommunens journalsystem.

Sjuksköterskan bör uppmärksamma patientansvarig läkare om en patient ofta får läkemedel genom generella direktiv. Läkaren ska då överväga om läkemedel givna enligt generella direktiv bör ordineras som stående- eller vidbehovsordination på grund av bestående förändring i patientens behov, eller om annan behandling kan vara aktuell.

Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om:

- läkemedelsnamn eller aktiv substans.
- Läkemedelsform.
- läkemedlets styrka.
- Dosering.
- Maxdos.
- Administreringssätt.
- indikationer och kontraindikationer.
- antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas.

Informationsruta 6

Läs mer:

Bilaga 8, Blankett Generella direktiv Melior.

Bilaga 9, Blankett Generella direktiv primärvård

[Generella ordinationer blankettbeställning Melior](#)

[Generella ordinationer rutin Melior](#)

5.1.5 Justering av dosering

Sjuksköterska får efter särskilt förordnande justera dosering i en ordination där den är beroende av patientens mål- eller mätvärden, under förutsättning att det är patientsäkert. Med dosjustering menas dositrering inom ett av läkaren förbestämt dosintervall.

Sjuksköterska som dosjusterar ska ha dokumenterade kunskaper inom det område som rör läkemedel aktuella för dosjustering, vilket ska specificeras i den lokala instruktionen.

Vid en justering av dosering ska detta dokumenteras i läkemedelsmodulen.

Enheten ska ha en lista i den lokala instruktionen över vilka sjuksköterskor som får dosjustera läkemedel. Vilka läkemedel som avses och riktlinjer för dosjustering av dessa ska finnas beskrivna.

Exempel på verksamheter där dosjustering kan vara aktuellt är diabetes-, hjärtsvikts-, och-antikoagulationsmottagning.

Läs mer:

Bilaga 7: Uppdrag att dosjustera ordinerat läkemedel.

Bilaga 7a: Dosjustering av läkemedel eller läkemedelsgrupp.

Bilaga 15: Lokal instruktion för läkemedelshantering slutenvård och specialistvård - Revidering pågår

Bilaga 16: Lokal instruktion för läkemedelshantering primärvård - Revidering pågår.

5.1.6 Förskriva naloxon

En sjuksköterska får, utan ordinarie förskrivningsrätt, förskriva läkemedel som innehåller naloxon och som enligt sitt godkännande kan administreras av andra personer än hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gäller under förutsättning att sjuksköterskan har den kompetens som krävs, vilket är att först genomgå specifik utbildning vars innehåll följer Naloxonprogrammet i Region Skåne.

Verksamhetschef eller av denne annan utsedd person för Region Skånes sprututbytesmottagningar eller beroendevårdsenheter, inklusive LARO-mottagningar ansvarar för att det görs en bedömning av om sjuksköterskan uppfyller kraven. Denna bedömning ska dokumenteras på avsedd blankett.

Läs mer: Bilaga 17: Uppdrag att förskriva naloxon.

5.1.7 Ordination enligt PM

Ordination enligt PM är förenad med ökad risk för felaktig eller utebliven läkemedelsbehandling. I syfte att minska risken ska ordination enligt PM användas restriktivt och enbart när annat ordinationssätt, (exempelvis ordinationsmall), inte är möjligt.

Om det förekommer ordinationer enligt PM inom vårdenheten ska det i den lokala läkemedelsinstruktionen beskrivas vilka läkemedelsbehandlingar som avses

5.2 Lämplighetsbedömning

Alla läkemedelsordinationer ska alltid utgå från patientens behov och ska därför föregås av att den som ordinerar gör en lämplighetsbedömning för att uppnå en ändamålsenlig och patientsäker ordination. Lämplighetsbedömning ska göras såväl vid insättning som vid utsättning av ett läkemedel, liksom vid ändring eller förlängning av en pågående läkemedelsbehandling.

Det innebär att förnyelse av recept alltid ska föregås av att ordinatören överväger om behandlingen ska fortsätta eller inte.

En aktuell läkemedelslista ska upprättas innan läkemedel ordineras eftersom hänsyn måste tas till pågående läkemedelsanvändning.

Läkemedlets kontraindikationer och andra viktiga faktorer för läkemedelsbehandlingen ska beaktas. Det kan handla om patientens inställning till behandlingen, sväljningssvårigheter, behov av enteral tillförsel, svårigheter att öppna vissa typer av förpackningar etc.

Vid lämplighetsbedömning ska följande särskilt tas hänsyn till:

- hälsotillstånd
- ålder
- kön
- läkemedelsanvändning
- pågående behandling och utredning
- överkänslighet mot läkemedel
- eventuell graviditet eller amning
- läkemedlets kontraindikationer och andra viktiga faktorer för läkemedelsbehandlingen.

Informationsruta 7

Läs mer: Läkemedelsavstämning, [kap. 4.1](#)

5.3 Dokumentation av läkemedelsordinationer

Läkemedelsordinationer ska dokumenteras i läkemedelsmodulen på ett strukturerat sätt och i ett enhetligt format och bör göras elektroniskt. Detta är viktigt för att den som ska ordinera, iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska ha tillgång till en samlad information om patientens läkemedelsbehandling. Pappersdokumentation av ordinationer ska endast ske i undantagsfall. Om det behövs extra anvisningar för ordinationen får en hänvisning till fastställda behandlingsscheman eller lokalt fastställt spädningsschema göras i ordinationshandlingen.

Läs mer:

[Stöddokument för Melior](#)

[Stöddokument för PMO](#)

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)

[Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO \(under Läkemedel - Manualer\)](#)

[Lärportalen Start sida](#) – sök utbildning Säker läkemedelshantering för läkare eller Säker läkemedelshantering för sjuksköterskor

5.3.1 Innehåll i läkemedelsordination

En läkemedelsordination ska innehålla uppgifter om:

- läkemedelsnamn eller aktiv substans.
- Läkemedelsform.
- läkemedlets styrka.
- Dosering.
- Administreringsätt.
- Administreringstillfällen.
- läkemedelsbehandlingsens längd.
- Ordinationsorsak.
- när och hur läkemedelsbehandlingen ska följas upp eller avslutas.
- i förekommande fall, anledningen till att läkemedlet inte får bytas ut mot ett likvärdigt läkemedel.
- övriga uppgifter som kan behövas för en säker hantering av läkemedlet.

Obs! Uppgift om maxdos per dygn ska dokumenteras vid en vidbehovsordination för att undvika överdosering.

Informationsruta 8

5.3.2 Ordinationsorsak

Ordinationsorsak ska alltid dokumenteras. Ett och samma läkemedel kan vara aktuellt för flera olika indikationer och ordinationsorsak förtydligar då läkemedelsbehandlingsens syfte. Ordinationsorsak är ett stöd för andra professioner i alla vårdformer och underlättar framtagande av utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse och aktuell läkemedelslista.

Uppgiften om ordinationsorsak bör anges genom användning av Socialstyrelsens nationella källa för ordinationsorsak när det blir möjligt.

Det kan vid vissa tillfällen finnas anledning att använda ett läkemedel utanför godkänd indikation (off label). I samband med detta har ordinerande läkare ett utökat ansvar att dokumentera övervägande kring behandlingsstrategin och skäl för val av läkemedel samt följa

behandlingsresultat och biverkningar. Off label förskrivning markeras med ett "obs!" på receptet.

5.3.3 Dokumentation av läkemedelsordinationer vid konsultation

Det rekommenderas att de föreslagna läkemedelsordinationer som ges i konsultsvar/remissvar skrivs in i läkemedelslistan i journalsystemet av patientansvarig läkare.

Vid telefonkonsultation ges ofta råd om läkemedelsbehandling. Den mottagande läkaren ska under samtalet bekräfta att han/hon uppfattat ordinationen genom att upprepa den.

Vid alla ordinationer som inte överensstämmer med FASS-text, eller som på annat sätt är exceptionell, bör skriftlig bekräftelse begäras.

5.3.4 Planering av uppföljning eller avslut av läkemedelsordination

Läkemedelsbehandlingen måste planeras, dokumenteras och följas upp för att säkerställa behandlingens effekt. Behandlingslängd bygger på vilken plan förskrivare tillsammans med patienten kommer fram till. Verksamheten ska ha fastställda lokala instruktioner för hur läkemedelsordinationer följs upp inom rimlig tid.

Läs mer:

Bilaga 15: Lokal instruktion för läkemedelshantering slutenvård och specialistvård - Revidering pågår

Bilaga 16: Lokal instruktion för läkemedelshantering primärvård - Revidering pågår.

5.3.5 Doseringsformat

Uppgiften dosering omfattar information om både dos och periodicitet. Genom att använda ett enhetligt format vid dokumentation av dosering minskar risken för missförstånd och felhantering.

Dosering ska anges i antal tabletter eller andra avdelade läkemedelsdoser per tidsenhet, eller volym per doseringstillfälle.

Internationella enheter ska vid ordinationen förkortas med E.

Observera att både förfyllda sprutor och ampuller kan förekomma för läkemedel där styrkan anges i enheter.

5.3.5.1 Doseringsformat för lågmolekylära hepariner

Lågmolekylära hepariner är högriskläkemedel med stor risk för förväxling mellan olika koncentrationer och förpackningstyper.

Förfyllda sprutor

Styrkan i förfyllda sprutor anges som antal enheter per spruta med en standardiserad volym (ex enligt FASS; Fragmin förfylld spruta 10 000 IE, 0,4 ml). Förfyllda sprutor ordinerar i dosenheter styck. Obs! Vid ordination i styck fungerar inte e-peds rimlighetskontroll av dos till barn <18 år (Melior).

Injektionsflaskor

Styrkan i injektionsflaskor anges i enheter per ml (ex. enligt FASS; Fragmin 10 000 IE/ml, 1 ml). Injektionsflaskor ordinerar i dosenheter E (enheter).

Läs mer: Doseringsformat, se

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)

[Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO \(under Läkemedel - Manualer\)](#)

5.3.6 Receptförskrivning

Elektronisk förskrivning (e-recept) är huvudregel. Receptblankett får endast användas i undantagsfall, till exempel vid teknisk störning. Receptblanketter med förtryckt arbetsplatskod ska förvaras inlåsta. Uttag av receptblanketter ska dokumenteras på så vis att uppföljning är möjlig. I den lokala instruktionen för läkemedelshantering ska det framgå hur receptblanketter förvaras och hanteras på enheten.

Läs mer:

[Arbetsplatskod - Vårdgivare Skåne](#)

[HSLF-FS 2021:75 förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit](#)

5.3.7 Utbyte av läkemedel på öppenvårdsapotek

För att patienten ska förstå den ordinerade läkemedelsbehandlingen och undvika felanvändning, ska varje förskrivare av läkemedel vid samtal med patienten/närstående förklara att utbyte av läkemedel kan komma att ske på apoteket vid receptförskrivning. Om det finns en medicinskt motiverad anledning till att läkemedlet inte får bytas mot ett likvärdigt, ska anledningen anges i journalen samt markeras på receptet.

5.4 Dokumentationssystem för läkemedelsordinationer

5.4.1 Dokumentation av läkemedelsordination i primärvård

I Region Skåne ordinerar läkemedel i den elektroniska läkemedelsmodulen i PMO. Ordinationshandling inom primärvård utgörs av patientens läkemedelslista i läkemedelsmodulen och är nåbar för alla användare inom primärvård inklusive privata vårdcentraler inom Hälsoval via det aktiva valet "Blå huset" (sammanhållen journalföring). Särskilda regler gäller för direktåtkomst av patientuppgifter inom sammanhållen journalföring.

Läs mer: [Sammanhållen journalföring](#)

Bilaga 15: Lokal instruktion för läkemedelshantering slutenvård och specialistvård - Revidering pågår

Bilaga 16: Lokal instruktion för läkemedelshantering primärvård - Revidering pågår.

5.4.2 Dokumentation av läkemedelsordination i slutenvård samt öppenvård

Läkemedel skall ordineras i läkemedelsmodulen i Melior. Enstaka undantag kan finnas för vissa specifika läkemedel som inte kan ordineras i Melior. Dessa undantagsordinationer ska skannas in i journalen.

Läkemedelsmodulen ska ge en samlad bild av patientens ordinerade och administrerade läkemedel.

Detta innebär att:

- Stående ordinationer, vilket inkluderar vidbehovsordinationer, återfinns på samma ställe.
- Läkemedelsmodulen utgör både ordinations- och administreringsunderlag.

Överföringar till andra arbetsunderlag får endast förekomma i fördefinierade fall som tydligt ska framgå av lokala instruktioner. Nödvändiga hänvisningar kan göras till lokalt fastställda behandlings- och/ eller spädningsscheman.

Exempel på detta är

- läkemedelslista för infusioner, t.ex. patientkontrollerad intravenös smärtbehandling (PCA)-lista, epidurallista
- akutjournal, anestesijournal, traumajournal och intensivvårdsavdelningens ordinationslista.

Observera att medicinska gaser är läkemedel och ska ordineras i Läkemedelsmodulen.

5.4.3 Dosdispenserade läkemedel för öppenvård

Dosdispenserade läkemedel förskrivs via ordinationsverktyget Pascal. Detta är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering, som behöver stöd och hjälp för att klara sin läkemedelshantering. Vid samtliga vårdbesök ska "förteckning recept" (tidigare benämnt "dosreceptet") medfölja patienten. Detta är viktigt för att uppmärksamma vården om att patienten har dosdispenserade läkemedel. Dock måste ansvarig läkare inom alla vårdformer alltid ta del av den senaste versionen i Pascal då ändringar kan ha skett sedan "förteckning recept" skrevs ut. Alla förskrivande läkare oavsett vårdform ansvarar för att medicinändringar förs in i Pascal och för kontroll av rimligheten i den totala läkemedelsbehandlingen, hänvisning till Läkemedelsavstämning [4.1](#). Utskrivande läkare från slutenvården

ansvarar för att patienten i förekommande fall reaktiveras i Pascal och att alla medicinändringar registreras i systemet.

Då patienten läggs in på sjukhus ska dosrullen med fördel tas med. Informationsknapp "DOS" i Melior ska aktiveras för att signalera att patienten har dosdispenserade läkemedel (samtliga personalkategorier har behörighet att göra detta). Vid utskrivning ska patienten förse med en mindre men nödvändig mängd läkemedel som räcker fram till dess patientens dosdispenserade öppenvårdsdoser respektive helförpackningar av läkemedel kan levereras. Om tilläggspåsar ska produceras för att komplettera ordinarie dospåsar, är det viktigt att tillse att patienten har tillgång till sin ordinarie dosrulle i hemmet. Se även 6.5.4.8 [Jourdos](#). Dospatient signaleras i PMO med ett kryss i rutan Dosexpedierade läkemedel under Patientinfo. På nedanstående hemsida hittar du riktlinjer samt kontinuitetsplan för dosdispenserade läkemedel i Region Skåne.

Läs mer:

[Dosriktlinjer i Region Skåne](#)

[Läkemedelsavstämning](#)

5.4.4 Läkemedelsordinationer till barn

Den som ordinerar läkemedel till ett barn ska göra detta med utgångspunkt i barnets behov. För att kunna ordinera läkemedel på ett säkert sätt bör barnspecifika beslutsstöd användas.

Vid ordination ska följande uppgifter beaktas:

- barnets vikt.
- barnets kroppsytta (när dosering baseras på kroppsytta).
- barnets ålder.
- styrkan (koncentrationen) på det färdigspädda läkemedlet.
- läkemedlets maxdos.

Informationsruta 9

Läkemedelsstödet ePed finns tillgängligt i slutenvården och minskar risken för felaktig läkemedelsbehandling och relaterade skador. Beslutsstödet ska ge förutsättningar för den som ordinerar ett läkemedel till ett barn att göra en rimlighetsbedömning av läkemedelsdoseringen. Ansvarig läkare får därmed stöd vid ordination av läkemedel och ansvarig sjuksköterska får stöd vid iordningställande av läkemedel.

I de fall läkemedel ska spädas och inte finns i ePed ska läkemedlet ordineras i ml av outspädd lösning. I anvisningsrutan i Melior ska tydligt framgå vilken faktisk dos av läkemedlet som barnet ska ha, angivet i mg. Därefter anges vilket spädningsmedium och vilken volym av detta som ska användas, vad slutkoncentrationen ska vara på det färdigspädda läkemedlet och vilken volym som ska ges.

Läs mer: [Beslutsstöd ePed](#)

6 Iordningställande, administrering eller överlämnande av läkemedel

För en patientsäker vård ska iordningställande, administrering eller överlämnande i största möjligaste mån ske i en obruten kedja. Det innebär att den som iordningställer ett läkemedel till en patient själv ska administrera eller överlämna läkemedlet till patienten. Undantag kan göras och läkemedlet kan administreras eller överlämnas av

annan behörig personal om det är förenat med god och säker vård. Innan en ordination iordningställs, administreras eller överlämnas ska den vara signerad ("pilad") av den som ordinerat läkemedlet. Undantag kan göras om patienten behöver omedelbar behandling.

Läs mer: [Behörigheter i Utdelningslistan i Melior](#) (Funktionerna Dosändring, Iordningställ, Överlämna, Administrera i Melior, lathund)

6.1 Iordningställande

6.1.1 Ostörd hantering

Ur patientsäkerhetssynpunkt är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt arbeta ostört och utan avbrott när man iordningställer läkemedel och att detta respekteras av kollegorna.

6.1.2 Kontroll vid iordningställande

Mot den dokumenterade ordinationen/generella direktivet ska följande kontrolleras:

- patientens identitet
- läkemedelsnamn eller aktiv substans
- läkemedelsform
- läkemedlets styrka
- dosering
- administreringsätt
- administreringstillfällen
- rimlighetsbedömning av den ordinerade och den iordningställda dosen.

Informationsruta 10

Vid iordningställande i form av spädning av läkemedel ska särskild försiktighet iakttas.

Vid spädning av läkemedel ska det finnas tydliga spädningsscheman och instruktioner att följa för den som iordningställer.

Läs mer:

Bilaga 15: Lokal instruktion för läkemedelshantering slutenvård och specialistvård - Revidering pågår

Bilaga 16: Lokal instruktion för läkemedelshantering primärvård - Revidering pågår.

6.1.3 Märkning av iordningställda läkemedel

Iordningställt läkemedel som inte omedelbart administreras eller överlämnas ska märkas med uppgifter om:

- patientens identitet
- läkemedelsnamn eller aktiv substans
- läkemedlets styrka
- tidpunkten för iordningställandet
- tidpunkten för administreringen eller överlämnandet
- vem som har iordningställt läkemedlet
- sådana övriga uppgifter som behövs för en säker hantering av läkemedlet.

Informationsruta 11

I vissa situationer iordningställs läkemedel till flera personer, för att sedan administreras vid andra tidpunkter. Då är det inte alltid logiskt att märkningen innefattar patientens identitet samt tidpunkten för överlämnande och administrering.

Exempel på sådana situationer är:

- Förfyllda sprutor som levereras via läkemedelsförsörjningen.
- Operationsverksamhet.
- Läkemedel förberedda för akut bruk.

Vårdgivaren får besluta om att ett iordningställt läkemedel inte behöver märkas med punkt 1 och 5 ovan under förutsättning att det är patientsäkert. Direktiv om märkning ska finnas i den lokala instruktionen för att säkerställa riktig märkning.

Enheter som använder Meliors läkemedelsmodul bör använda Zebra etikettskrivare tillsammans med Meliors etikettfunktion vid märkning av iordningställda läkemedel.

Läs mer:

Bilaga 15: Lokal instruktion för läkemedelshantering slutenvård och specialistvård - Revidering pågår

Bilaga 16: Lokal instruktion för läkemedelshantering primärvård - Revidering pågår.

6.2 Iordningställande av olika läkemedelsformer

Tillredning av läkemedel bör ske i läkemedelsrummet på en speciellt avsedd plats.

Den största risken för exponering av läkemedelssubstanser är vid beredning och administrering.

De vanligaste kontaminationsvägarna är:

- aerosolbildning i samband med beredning, t.ex. övertryck vid spädning av torrampull mm.
- stänk, läckage eller aerosolbildning vid justering av volym och luft från spruta
- läckage vid överföring av lösning till spruta eller infusionsvätska samt kopplingar, t.ex. vid injicering
- damning vid krossning eller delning av tabletter
- ångbildning från intorkat spill samt omhändertagande av avfall.

Informationsruta 12

6.2.1 Injektioner och infusioner

Följande ska beaktas vid iordningställande av injektioner och infusioner:

- Arbetsytan torkas med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid före tillredning.
- Membran på injektionsflaskor/infusionspåsar desinfekteras med alkohol före punktion/brytning.
- Syna infusions- och injektionsvätskor före arbetets början och granska även de färdiga lösningarna.
- Tillsatserna ska göras omedelbart före användningen och innehållet måste blandas efter varje tillsats.
- Vid uppdragning från brytampull av glas bör kanyl med filter användas.

Informationsruta 13

På grund av risk för överföring av blodburen smitta ska flerdosampull/flaska användas restriktivt. Om en flerdosampull använts patientnära får denna inte användas till ytterligare patient utan måste kasseras.

Kvarsittande kanyler ska inte förekomma. Använd spruta får inte återfyllas, detta gäller även sprutor till infusionspumpar. Observera att olika hållbarhets- och användningstider förekommer. Hänvisning till kap. [6.3](#).

Insulin är ett riskläkemedel. Då insulinpennor används ska dessa vara patientbundna. Insulinpennor ska inte användas som ampuller. Insulinpennor (olika preparat) förekommer i flera olika styrkor, utöver 100 E/ml finns även 200 och 300 E/ml. Insulin ingår även i kombinationsläkemedel till exempel Suliqua.

När flerdosampull/flaska används gäller följande:

Icke patientbunden flerdosampull/flaska ska

- förvaras i läkemedelsrummet/ låst läkemedelsvagn
- märkas med öppningsdatum, klockslag och signum vid första punktion
- dras upp med ny spruta vid varje uppdragningstillfälle.

Patientbunden flerdosampull/flaska ska

- i första hand förvaras i patientlåda i läkemedelsvagn
- märkas med patient-ID, öppningsdatum, klockslag och signum vid första punktion
- dras upp med ny spruta vid varje uppdragningstillfälle.

Informationsruta 14

6.2.2 Perorala läkemedel

6.2.2.1 Tabletter och kapslar

Följande ska beaktas vid iordningställande av tabletter och kapslar:

- Arbetsytan torkas med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid före tillredning.
- En medicinbägare märkt med patientidentitet ska användas vid iordningställandet.
- Läkemedel i flaska eller burk iordningställs alltid med något hjälpmedel (sked, pincett, extra medicinbägare eller förpackningslocket).
- Tablettdelare används för att få en god doseringsnoggrannhet, när del av tablett ordinerats.
- Lös tablett, hel eller delad, får inte återföras till originalförpackning efter uttag.
- Tablettdelare och tablettkross torkas ur med

Informationsruta 15

Vissa tabletter och kapslar **måste** sväljas hela. Uppgifter om vilka tabletter/kapslar som måste sväljas hela finns huvudsakligen i FASS under delbarhetsinformation samt i appen och på webbsida Stöd vid läkemedelshantering. Om en tablett är lämplig att krossa, sker detta med hjälp av tablettkross. Vid all krossning av läkemedel måste risken för överkänslighetsreaktioner och annan toxisk effekt beaktas – dels genom att det dammar, dels genom att läkemedel kan bli kvar till nästa patient. Se även [6.2.5.](#)

Läs mer:

[Stöd vid läkemedelshantering](#)

6.2.2.2 Flytande läkemedel

Flytande läkemedel mäts upp med hjälp av medicinbägare eller pipett. Ges flytande läkemedel peroralt med hjälp av spruta och eventuell sond, ska en oral eller enteral spruta användas. Adaptor med kork appliceras på flaskan.

6.2.3 Läkemedel via sond

För att undvika förväxlingar när läkemedel ges via sond ska endast sprutor för enteral nutrition användas. Dessa sprutor kan inte kopplas till venösa infarter, artärkateter eller epiduralkateter och har dessutom en avvikande färg (lila).

Identifiera läkemedel som kan sättas ut, läkemedelssubstanser och läkemedelsformer som kan administreras enteralt, och läkemedel där alternativ administreringsväg kan nyttjas.

Flytande orala beredningar, lösliga tabletter och vanliga tabletter som får finfördelas och är lätta att lösa upp/slamma upp i vatten är de läkemedelsformer som rekommenderas i första hand vid enteral administrering. Observera att vissa tabletter inte får krossas för att ges via sond. Om enteral administrering är vanligt förekommande i verksamheten rekommenderas att specificera hanteringen för varje ingående läkemedel i bassortimentet i den lokala instruktionen.

Läs mer:

[Regional riktlinje för standardiserad märkning av in- och utfarter](#)

[Läkemedelsverkets kunskapsstöd enteral läkemedelsadministrering](#)

[Läkemedelstillförsel - Vårdhandboken](#)

Bilaga 15: Lokal instruktion för läkemedelshantering slutenvård och specialistvård - Revidering pågår

Bilaga 16: Lokal instruktion för läkemedelshantering primärvård - Revidering pågår.

6.2.4 Patientindividuellt packade doser (PiD) till sjukhusens vårdavdelningar

PiD är maskinell dosdispensering av läkemedel till patienter som vårdas på sjukhusens avdelningar. Läkarens ordination i Melior överförs direkt, utan några manuella mellanleder, till produktion hos läkemedelsleverantören. Tjänsten avser tabletter och kapslar förpackade till varje patient och doseringstillfälle i tydligt märkta dospåsar. Det fabrikat som levereras i dospåsarna är det som är ordinerat i Melior, vilket förbättrar spårbarheten. Var uppmärksam på att alla ordinerade perorala läkemedel inte kan packas maskinellt. Komplettering med manuellt iordningställande ska då göras.

Läs mer:

[Patientindividuellt packade doser, PiD](#)

6.2.5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt

Beredning av parenterala lösningar för cytostatikabehandling bör göras på lokal tillverkningsenhet. I de fall beredningar sker på vårdenhet/mottagning ska dessa vara utrustade med säkerhetsbänk och övrig nödvändig utrustning för arbetet. Följ lokala skyddsinstruktioner. Observera att många monoklonala antikroppar tillhör samma ATC-kod som cytostatika (L01). Efter riskbedömning kan dock dessa i många fall hanteras som läkemedel med risk för bestående toxisk effekt (motsvarande till exempel penicillin). Vid årlig sortimentsgenomgång identifieras enhetens riskläkemedel och rutiner för hantering anges i den lokala instruktionen. Produktspecifika skyddsinformationsblad kan hämtas för de flesta läkemedel från FASS.

I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:5 inklusive ändringsföreskrift 2009:6 finns föreskrifter om handhavande av cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. För cytostatika finns detaljerad instruktion i Vårdhandboken.

Beredning av läkemedel som kan ge toxisk effekt:

- Beredning av t.ex. antibiotika bör ske på en speciellt avskild plats för att undvika kontamination vid beredning av andra läkemedel. Ett absorberande underlag används för att minska spridning av ev. spill.
- Arbetsytan torkas av med vatten (avlägsnar spill) och därefter med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
- Skyddsrock ska användas och vara lokalbunden. Arbetsdräkt som kontamineras vid beredningen ska bytas direkt. Om det finns risk för stänk i ögonen ska skyddsglasögon eller visir användas.
- Handskar och spike används lämpligen för att skydda personen från direktkontakt med läkemedlet. För cytostatika krävs ett slutet system.

Informationsruta 16

Läs mer:

[Cytostatika och cytotoxiska läkemedel - Arbetsmiljöverket](#)

[Vårdhandboken](#)

[FASS](#)

Bilaga 15: Lokal instruktion för läkemedelshantering slutenvård och specialistvård - Revidering pågår

Bilaga 16: Lokal instruktion för läkemedelshantering primärvård - Revidering pågår.

6.2.6 Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter (ATMP)

Läkemedel för avancerade terapier är en relativt ny klass av läkemedel. Hit räknas genterapi, somatisk cellterapi, vävnadsteknisk produkt samt kombinerade produkter. Dessa läkemedel kräver särskilda tillstånd och funktioner (ex. vävnadsinrättningstillstånd, tillstånd och möjlighet att hantera GMO/GMM, möjlighet till lågtemperatur-/kryoförvaring etc). Region Skåne har etablerat ett ATMP-centrum och alla nya ATMP-projekt (dvs. projekt där patienter ännu inte behandlats eller som innebär användning av icke-etablerade behandlingar), vilka tar Region Skånes resurser i anspråk, måste utvärderas av ATMP-centrum innan de startas upp. Kontakt ATMP-centrum: ATMP-centrum@skane.se

6.2.7 Medicinska gaser

Medicinska gaser (andningsoxygen, andningsluft, lustgas) är läkemedel och ska ordinerars av läkare med angett flöde (l/min) och behandlingstid. Sjuksköterskan signerar administrerad gas i likhet med övriga läkemedel.

6.3 Användningstider för läkemedel

I SLS (Svensk Läkemedelsstandard) finns information om förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel. I dokumentet finns information om användningstider både för läkemedel med krav på sterilitet (t.ex. infusioner, injektioner, ögondroppar) och för läkemedel utan krav på sterilitet (t.ex. mixturer, näsdroppar).

Användningstid för sterila läkemedel som iordningställts på avdelning är 12 timmar i rumstemperatur enligt SLS. Detta gäller i de fall inget annat har angetts av tillverkare.

Rekommendationerna är baserade på mikrobiologiska aspekter eftersom kemisk-fysikaliska egenskaper är relaterade till den enskilda produkten. Om kortare hållbarhet för bruten förpackning baserat på kemiskfysikaliska egenskaper hos produkten är angiven, är det denna hållbarhetstid som gäller.

Undantag från ovanstående kan göras i följande fall:

- Infusionsvätskor (t.ex. Glukos, Natriumklorid) utan tillsats – användningstid 24 timmar.
- TPN påsar med/utan tillsats - användningstid 24 timmar.

Informationsruta 17

Vid förlängd hållbarhet för infusionsvätskor med tillsats ska riskanalys gällande förlängd hållbarhet göras i samråd med vårdhygienisk och farmaceutisk kompetens. Beslut fattas av verksamhetschef/medicinskt ledningsansvarig.

Läs mer: [Svensk läkemedelsstandard 2025.2](#)

6.3.1 Brytningsdatum

Brytningsdatum ska antecknas på etiketten på alla krämer och liknande samt flytande läkemedel. På injektionsflaskor skrivs datum och klockslag.

6.4 Dokumentation vid iordningställande av läkemedel

I journalen ska följande dokumenteras:

- Vem som har iordningställt läkemedlet.
- När läkemedlet har iordningställts.
- Vem som har utfört en kontroll av ordinationen.
- Tidpunkten för kontrollen.
- Batchnummer om det är fråga om ett biologiskt läkemedel så som vaccin, antikroppar etc. i de fall där det är tillämpligt.
- Om läkemedlet har bytts ut mot ett likvärdigt läkemedel anges namnet på det läkemedel som har iordningställts.

Informationsruta 18

I de fall en farmaceut är ansvarig för iordningställande av läkemedel, ska detta signeras i Meliors utdelningsvy – iordningställande, vilket kräver tillägg i behörighet för farmaceuter.

Läs mer:

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)

[Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO \(under Läkemedel - Manualer\)](#)

6.5 Administrering och överlämnande

6.5.1 Kontroll vid administrering eller överlämnande av läkemedel

Följande kontrolleras mot den dokumenterade ordinationen/generella direktivet:

- patientens identitet.
- läkemedelsnamn eller aktiv substans.
- Läkemedelsform.
- läkemedlets styrka.
- Dosering.
- Administreringsätt.
- Administreringstillfällen.
- rimlighetsbedömning av den ordinerade och den iordningställda dosen.

Vid kontinuerlig infusion av läkemedel ska kontrollen göras återkommande och vid varje tillfälle som ansvaret för administreringen övergår från en behörig hälso- och sjukvårdspersonal till ny ansvarig.

Informationsruta 19

Kontrollen ska dokumenteras, hänvisning till [6.6](#).

Vid utdelning av patientindividuellt packade doser (PiD) kontrolleras att patientens identitet (namn och personnummer), datum, klockslag samt ordinerade läkemedel, styrka samt antal tabletter/kapslar stämmer överens mellan utdelningslistan och texten på dospåsen.

6.5.2 Administrering av parenterala läkemedel

Omedelbart före användningen ska den som administrerar en infusion eller injektion kontrollera att förpackningen är oskadad och att lösningens utseende inte avviker från det normala. För att säkerställa infusionshastigheten bör den kontrolleras regelbundet under infusionens gång.

Vid kontinuerlig infusion av läkemedel ska kontroll, som beskrivits i informationsruta 19, göras återkommande och vid varje tillfälle som ansvaret för administreringen övergår från en behörig hälso- och sjukvårdspersonal till någon annan med samma behörighet.

Kontrollen ska dokumenteras.

Läs mer:

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)

[Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO \(under Läkemedel - Manualer\)](#)

6.5.3 Parallellinfusion

Endast läkemedel som är kompatibla ska administreras i samma infart. Backventil ska alltid användas. Om antalet läkemedel överskrider antalet tillgängliga intravenösa infarter måste det övervägas vilka läkemedel som kan ges i samma infart, eller om något läkemedel kan administreras vid annan tidpunkt eller via en annan administreringsväg. Parallellinfusion av läkemedel som inte är kompatibla eller där information saknas innebär en risk för kateterockklusion, terapisvikt samt embolier och ska undvikas. Information finns ibland i läkemedlets produktresumé. Man kan också vända sig till klinisk farmaceut vid frågor om parallellinfusion av läkemedel.

6.5.4 Administrering av läkemedelsinnehållande plåster

När plåstret appliceras på patienten ska dagens datum och klockslag noteras på plåstret och det ska journalföras var det nya plåstret är placerat. När plåstret avlägsnas ska det journalföras att det är borttaget. Dokumentation i Melior sker i utdelningskommentar.

Det använda plåstret viks ihop och placeras i riskavfall. För att en fullgod effekt ska uppnås under tiden plåstret sitter på huden krävs det att beredningen är överladdad, d.v.s. innehåller mer läkemedel än vad som tas upp av patienten.

Se även avfallshandboken: [Läkemedelsavfall](#)

6.5.5 Överlämnande av perorala läkemedel

Doseringstillfällena ska i de flesta fall fördelas så jämnt som möjligt över dygnet.

Det är särskilt viktigt när det gäller antibiotikabehandlingar.

Följande tider rekommenderas för intag av perorala läkemedel:

1 gång dagligen = klockan 8.

2 gånger dagligen = klockan 8 och 20.

3 gånger dagligen = klockan 8, 14 och 20.

I många fall krävs andra doseringstider.

Läkemedel som ska doseras jämnt över dygnet:

Använd d-metoden för att fördela doseringen jämt över dygnet, t.ex.

1d3 = 00 – 08 - 16

1d6 = 02-06-10-14-18-22

Informationsruta 20

Tabletter, kapslar och pulver ska intas med riklig mängd vätska. Intag av läkemedel i liggande ställning bör undvikas. Vissa läkemedel kan ge skador i matstrupen om de fastnar där. Patienter med sväljsvårigheter bör få sina läkemedel i andra beredningsformer, till exempel lösning, suppositorium.

Läs mer:

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)

[Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO \(under Läkemedel - Manualer\)](#)

6.5.6 Överlämnande – dialog med patient/ närstående

Vid överlämnande ska patienten få information om det sätt på vilket läkemedlet ska intas (till exempel under tungan, till/mellan måltider, sväljes hela). Den som överlämnar läkemedlet ska göra sig underrättad om både positiva och negativa effekter av läkemedlet samt om det föreligger några problem i samband med intaget. Hänvisning till [6.6](#) gällande dokumentation av överlämnande.

6.5.7 Användande av patientens egna läkemedel i slutenvården

Patientens egna läkemedel kan användas i slutenvård under förutsättning att detta sker i överenskommelse mellan behandlande läkare och patient. Användandet av patientens egna läkemedel får inte äventyra patientsäkerheten. Användning av patientens medhavda läkemedel kan ske under följande förutsättningar:

- Om det är ovanliga läkemedel t.ex. licensläkemedel.
- Personbunden läkemedelsförpackning t.ex. inhalationsläkemedel, insulinpennor, p-piller och ögondroppar.
- Patientens egna dosförpackade läkemedel om förpackningen är obruten och hela innehållet administreras.

Informationsruta 21

Gällande användande av patient medhavda läkemedel innehållande narkotika se [8.6.2 Förvaring av narkotika](#)

Medhavda läkemedel som inte ska användas under vårdtiden ska i första hand tas tillbaka till hemmet av närstående eller ombud,

alternativt förvaras inlåsta i läkemedelsvagn eller läkemedelsrum. Förvaring ska ske avskilt från övriga läkemedel i läkemedelsrummet.

En avliden persons privata läkemedel är formellt dödsboets egendom. Av säkerhetsskäl bör stor restriktivitet tillämpas vid utlämnandet av läkemedel från sjukvården till anhöriga. En god rutin kan vara att påtala för anhöriga att överblivna läkemedel lämpligen skickas för destruktion och be om deras godkännande. Speciellt gäller det narkotika eftersom det är brottsligt att inneha eller bruka någon annans narkotikaklassade läkemedel.

Om en inneliggande patient som har öppenvårdsdos avlider ska patienten markeras som avliden i Pascal för att undvika onödig dosproduktion. Har patient som avlider recept sker lämpligen en översyn av behov av makulering av dessa.

6.5.8 Patientmedverkan

6.5.8.1 Egenvård inom slutenvården, ”Sköter själv”

Enligt patientlagen (2014:821) ska hälso- och sjukvården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. En patients medverkan, genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder, ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar. Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

Vid inskrivning av en patient i slutenvård ska hälso- och sjukvårdspersonal bedöma om en patient har möjlighet att själv fortsätta att ansvara för sin egen pågående läkemedelsbehandling. Bedömningen ska göras återkommande under vårdtiden då patientens tillstånd eller behandling kan komma att ändras.

Om patienten sköter sina läkemedel själv, ska detta dokumenteras i läkemedelslistan som ”sköter själv” (SS) och visas i läkemedelslistan med symbolen för detta. Läkemedel som patienten sköter själv behöver inte signeras i läkemedelslistan. Det är mycket viktigt med tydlig kommunikation med patienten vid eventuella ordinationsförändringar så att läkemedelsanvändningen blir korrekt. Det är viktigt att det finns ett låsbart skåp där patientens läkemedel förvaras. Nyckel eller kod ges till patienten.

6.5.8.2 Egenvård inom öppenvården

Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt de definitioner som finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), utan en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Om patienten behöver praktisk hjälp för att utföra egenvården, ska den behandlande legitimerade yrkesutövaren samråda med de som kan hjälpa patienten. Det kan vara närstående, ansvarig inom socialtjänsten eller ansvarig befattningshavare hos en annan aktör, exempelvis kommunal hälso- och sjukvårdspersonal, HVB-hem eller andra särskilda boenden. Egenvårdsbedömningen ska dokumenteras och kontinuerligt följas upp och utvärderas av den hälso- och sjukvårdspersonal som gjort bedömningen. Läs mer i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2022:1250) om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Skulle egenvård efter bedömning inte anses vara lämpligt gäller som i övrig läkemedelshantering Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Läs mer:

[Lag \(2022:1250\) om egenvård | Sveriges riksdag \(riksdagen.se\)](#)
[HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel](#)

Bilaga 15: Lokal instruktion för läkemedelshantering slutenvård och specialistvård - Revidering pågår

Bilaga 16: Lokal instruktion för läkemedelshantering primärvård - Revidering pågår.

6.5.8.3 Trygghetsdos

I vissa verksamheter avgör sjuksköterskan tillsammans med läkare om behov finns för patient att själv ha tillgång till ordinerad "vidbehovs-dos". Detta ska användas restriktivt. Trygghetsdos kan vara aktuellt vid till exempel smärtbehandling i palliativ vård men även i situationer inom andra verksamheter. Patienten ska vara välinformerad om läkemedlet. Läkemedlet ska märkas med patient-id och läkemedlets namn och styrka. Avstämning med patient görs vid varje läkemedelsutdelning. Läkemedel som inte används ska inte återföras till sortimentet i läkemedelsförrådet. Dokumentation av iordningställande och överlämnande av trygghetsdos ska göras i journalsystemets läkemedelsmodul. Lokal instruktion för hur trygghetsdos dokumenteras ska finnas.

6.5.8.4 Jourdos

Jourdos kan även benämnas Hemgångsdos eller Permissionsdos. Läkemedel kan behöva skickas med patienten från sjukvården för att undvika avbrott eller fördröjning av läkemedelsbehandlingen. Detta kan vara nödvändigt till dess att patienten kan få läkemedlet expedierat på apotek eller att dospåsar finns tillgängliga. Läkemedel får inte överlämnas i större mängd än vad som är nödvändigt. Om läkemedel (som ej är avsett att intas omedelbart) överlämnas till patienten, ska det ske i läkemedelspåse eller annan lämplig förpackning.

Förpackning för jourdos förses med:

- patientens namn
- födelsedata
- läkemedlets namn och styrka
- datum för överlämnandet
- anvisningar om läkemedlets användning
- den ordinerandes namn
- signum av den som iordningställt förpackningen.

Informationsruta 22

För avdelningar som har PiD kan även jourdoser beställas för 3 eller 5 dagar.

Läs mer:

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)
[Patientindividuella packade doser \(PiD\) - Region Skånes intranät](#)

6.6 Dokumentation vid administrering eller överlämnande av läkemedel

6.6.1 Dokumentationskrav

I journalen ska följande dokumenteras:

- Vem som har administrerat eller överlämnat läkemedlet.
- När läkemedlet administrerats eller överlämnats.
- Vem som har utfört en kontroll av ordinationen, se inforuta 10.
- Tidpunkten för kontrollen.
- Batchnummer, om det är fråga om ett läkemedel för vaccination eller ett biologiskt läkemedel i de fall där det är tillämpligt.
- Om läkemedlet har bytts ut mot ett likvärdigt läkemedel ska även namnet på det läkemedel som har administrerats eller överlämnats dokumenteras.
- I de fall en patient inte kan inta/ges en ordinerad läkemedelsdos ska detta dokumenteras i ordinationshandlingen.
- Om läkemedlet är iordningställt av annan än den som administrerar läkemedlet ska detta dokumenteras.
- Hemgångsdos/läkemedel som lämnas ut till patient ska dokumenteras i journal enligt lokal instruktion.

Informationsruta 23

Läs mer:

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)

[Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO \(under Läkemedel - Manualer\)](#)

6.6.2 Läkemedel som får bytas ut

En gemensam utbyteslista fastställs i Region Skåne för läkemedel som beställs på rekvisition. En kompletterande sortimentsstyrningslista används som stöd för läkemedelsleverantören för lämplig lagerhållning, vid respektive vårdenhets revidering av bassortiment och beställning av icke-bassortiment.

Utbyteslistan (inklusive analoga listan) och sortimentsstyrningslistan styr sortimentet mot avtalade och rekommenderade läkemedel i Region Skåne, se [Beställa läkemedel Vårdgivare Skåne](#).

Framtagande av överenskommet sortiment i basförråden på vårdenheterna syftar till att uppnå hög tillgänglighet av läkemedel, låg lagerkostnad, minimal kassation. Överenskommet sortiment utgör ett reducerat sortiment avseende förpackningsstorlekar och synonymer (likvärdiga läkemedel).

Vid rekvirering av läkemedel på utbyteslistan och sortimentsstyrningslistan ska i första hand läkemedel i kolumnen ”Styrning TILL 1: a hand” beställas.

Läkemedelsleverantören byter, förutom enligt utbyteslistan, alltid till övriga utbytbara avtalade läkemedel. Läkemedelsleverantören byter även till hänvisade preparat enligt sortimentsstyrningslistan. Om beställaren absolut vill ha ett annat preparat än det hänvisade anges FÅR EJ BYTAS i fältet ”Instruktion till leverantör” på den aktuella varuraden.

Ordinatören ska i största möjligaste mån ordinera läkemedel som är rekommenderade och avtalade i Region Skåne. Om en situation uppstår där ordinatören valt ett läkemedel som inte är tillgängligt i enhetens bassortiment, eller att logistikcentrum tillhandahållit ett annat likvärdigt läkemedel än det beställda,

- får sjuksköterskan byta till det likvärdiga läkemedlet enligt utbyteslistan (obs ej analoglistan).
- får sjuksköterskan byta till ett likvärdigt läkemedel inom respektive **utbytbarhetsgrupp via FASS.se** utan kontakt med ordinerande läkare.
- **Observera.** Sjuksköterskan får **inte** byta ut genom att använda sig av Aktiv substans eller ATC-koden.

Se bifogat exempel, Fass.se:

Läkemedelsnamn

~~Aktiv substans:~~
~~Paracetamol~~

~~ATC-kod:~~
~~N02BE01~~

Utbytbarhet:
[Utbytbara läkemedel](#)

↓

Utbytbarhetsgrupp

Paracetamol, Tablett 500 mg (Grupp A)

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se [Läkemedelsverkets webbplats](#) om utbyte.

Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel. Produkter/förpackningar som ej ingår i läkemedelsförmånen är inte direkt utbytbara på apotek.

Utbytbarhetsinformation för: Panodil®, Filmdragerad tablett 500 mg

Alvedon®, Filmdragerad tablett 500 mg GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB Vissa förpackningar ingår i förmånen	>
Oparap, Filmdragerad tablett 500 mg Apofri Vissa förpackningar ingår i förmånen	>
Pamol, Filmdragerad tablett 500 mg Takeda Pharma Vissa förpackningar ingår i förmånen	>
Panodil®, Filmdragerad tablett 500 mg Perrigo Vissa förpackningar ingår i förmånen	>

- Vid osäkerhet om utbyte får genomföras ska ordnatören kontaktas.
- Sjuksköterskan dokumenterar preparatbytet i sin journalhandling samt tillser att ordinationen snarast ändras av läkare till aktuell synonym.
- För läkemedel som förskrivs på recept gäller att apoteken har skyldighet att byta läkemedel (i utbytbarhetsgrupper) till likvärdigt läkemedel enligt TLV:s (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) prissättning.

Läs mer: [Beställ läkemedel - Vårdgivare Skåne](#) (under rubrik Utbyteslista).

6.6.3 Batchnummer

Läkemedelsverket kräver att batchnummer alltid ska anges vid rapportering av biverkningar gällande biologiska läkemedel och substanser. Detta är viktigt för spårbarheten och därför ska detta dokumenteras i journal när denna typ av läkemedel administreras eller överlämnas.

Ett biologiskt läkemedel är ett preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad).

Biologiska läkemedel kan vara vacciner, blodprodukter/plasmaderiverade läkemedel (t ex albumin, immunoglobuliner, koagulationsfaktorer), antiserum (mot olika typer av gift, t ex ormgift), antikroppar, enzymer, interferoner, peptidhormoner, peptider, vissa komplexa polysackarider (t ex hepariner) och avancerade terapier (genterapi, somatisk cellterapi eller vävnadsteknisk produkt).

I söktjänsten Läkemedelsfakta på Läkemedelsverkets hemsida finns information om alla enskilda läkemedel. Här finns även bipacksedlar och produktresuméer och möjlighet att se om en produkt eller substans räknas som ett biologiskt läkemedel och därmed behöver journalföras gällande batchnummer.

Batchnummer ska dokumenteras för minst följande läkemedelsgrupper:

- vaccin
- blodprodukter/plasmaderiverade läkemedel
- antiserum
- monoklonala antikroppar
- TNF-alfahämmare.

Informationsruta 24

Detta gäller tills de tekniska förutsättningarna i journalsystemen är utvecklade för att kunna dokumentera batchnummer för alla biologiska läkemedel.

De verksamheter som hanterar denna typ av läkemedel frekvent i sin verksamhet, ska ha en rutin för dokumentation av batchnummer i den lokala instruktionen.

Läs mer:

[Läkemedelsverkets läkemedelsfakta](#)

Bilaga 15: Lokal instruktion för läkemedelshantering slutenvård och specialistvård - Revidering pågår

Bilaga 16: Lokal instruktion för läkemedelshantering primärvård - Revidering pågår.

6.6.4 Läkemedelsbiverkningar

Det är viktigt att all personal som har patientkontakt är observant på läkemedelsbiverkningar och rapporterar gjorda iakttagelser. Observerad eller av patient meddelad läkemedelsbiverkning noteras i journalen samt meddelas läkaren.

Alla misstänkta biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket, även om allvarliga, tidigare icke kända biverkningar och biverkningar av nya läkemedel ska prioriteras. Även misstänkta biverkningar som har samband med exponering i arbetet ska rapporteras. Utebliven effekt samt förgiftningar med och missbruk av nya läkemedel räknas som biverkningar enligt EU:s rapporteringskrav. Biverkningar av natur-/växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel (VUM) följer samma krav och regelverk. Vid rapportering av biologiska läkemedel till exempel vacciner, interferoner, peptider och monoklonala antikroppar är det viktigt att batchnummer anges.

6.6.5 Utökad övervakning

Idag finns en markering (▼) i FASS, på läkemedlets bipacksedel samt i journalsystemen som innebär att detta läkemedel är föremål för utökad övervakning i hela EU. Utökad övervakning gäller bland annat för läkemedel med en ny aktiv substans eller biologiska läkemedel (till exempel vaccin eller läkemedel som är framställt ur plasma). Patienter och hälso- och sjukvårdspersonal uppmuntras särskilt att rapportera alla misstänkta biverkningar av läkemedel som har den svarta triangeln, så att ny information snabbt kan utvärderas.

Läs mer:

[LVFS 2012:14 säkerhetsövervakning av humanläkemedel](#)

[Läkemedelsverket biverkningsrapportering](#)

[Läkemedelsinformationscentral Region Skåne](#)

[Läkemedelsverket, Utökad övervakning](#)

[Läkemedelsförsäkringen](#)

6.6.6 Överkänslighet

Läkare och i förekommande fall sjuksköterska ska alltid, innan behandling med läkemedel ges eller undersökning påbörjas, ta reda på om patienten tidigare haft symtom på överkänslighet.

Dokumentation om överkänslighet ska göras på avsedd plats i journalsystemet. Överkänslighetsreaktioner som anafylaktisk chock, astma eller allvarliga hudreaktioner vid behandling med läkemedel ska alltid anmälas som biverkningsrapport till Läkemedelsverket.

Läs mer:

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)

[Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO \(under Läkemedel - Manualer\)](#)

7 Delegering

Läkemedelshantering⁴ är ett riskfyllt område som har inverkan på patientsäkerheten. Därför är vårdgivaren skyldig att fastställa rutiner för hantering av läkemedel i verksamheten⁵ inom ramen för vårdgivarens ansvar för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete⁶. Delegering av iordningställande, administrering eller överlämnande av läkemedel får endast användas när en rad kvalitets- och kunskapskrav är uppfyllda vilket ställer höga krav på både den som delegerar en uppgift och på den som mottar den delegerade uppgiften. I Region Skåne ska verksamheter för hälso- och sjukvård ha en säker läkemedelshantering⁴ och huvudregeln är att läkemedelshantering⁴ ska utföras av behörig personal. Det innebär att delegering ska användas restriktivt. Delegering ska inte användas för att lösa brist på personal med formell kompetens, inte heller för att lösa ekonomiska brister.

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god och säker vård uppfylls.

En riskanalys ska ha genomförts och dokumenterats, innan varje beslut om delegering tas. Vilka arbetsuppgifter inom läkemedelshantering⁴ som kan delegeras i varje verksamhet varierar och ska utgå från en samlad bedömning av de risker som är förknippade med verksamhetens läkemedelshantering⁴, utifrån verksamhetens patientgrupp, läkemedelsanvändning, arbetsprocesser, kompetens och organisatoriska förutsättningar. Läkemedelshantering⁴ ska utgå från verksamhetsnära riskanalyser och anpassas efter verksamhetens karaktär. Verksamhetens rutiner ska bygga på en analys av de risker som finns i berörd verksamhet.

7.1 Delegering betyder att behörig hälso- och sjukvårdspersonal ger någon annan personal rätt att utföra en arbetsuppgift som den annars inte får göra

För vissa arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården finns särskilda bestämmelser som kräver att endast hälso- och sjukvårdspersonal med en viss behörighet får utföra dem. Dessa reglerade

⁴ Med termen läkemedelshantering avses här iordningställande, överlämnande och administration.

⁵ 4 kap. 1 – 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

⁶ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

arbetsuppgifter får delegeras endast om det uttryckligen anges i författning att delegering är tillåten. Att iordningsställa och administrera eller överlämna läkemedel till en patient är samtliga reglerade arbetsuppgifter som kräver en viss behörighet. Uppgifterna får under vissa förutsättningar delegeras till personal som saknar behörighet att utföra uppgifterna. Möjligheten att delegera uppgifterna gäller i såväl öppen som sluten vård samt i ambulanssjukvård⁷.

7.2 Ansvar hos den enskilde hälso- och sjukvårdspersonalen gällande kontroll och dokumentation

Uppgifterna iordningställande, administrering eller överlämnande av läkemedel omfattas av omfattande krav avseende kontroll och dokumentation oavsett om de ligger inom ordinarie yrkesutövning eller om de tillkommit genom delegering⁸. Det betyder att den som mottagit en delegering för till exempel administrering av läkemedel, har samma skyldigheter och ansvar och ska följa samma kontroll- och dokumentationskrav som vilar på den behörige hälso- och sjukvårdspersonalen. I tabell 2 finns beskrivning av samtliga krav avseende kontroll och journaldokumentation som gäller i samband med iordningställning, administrering eller överlämnande av läkemedel.

⁷ 9 kap. 1 § HSLF-FS 2017:37

⁸ 8 kap HSLF-FS 2017:37

Tabell 2 Krav på kontroller och journaldokumentation i samband med iordningställande, administrering eller överlämnande av läkemedel.

Arbetsuppgift	Beskrivning	Kontroller som ska utföras av den som iordningställer, administrerar eller överlämnar läkemedel	Uppgifter som ska dokumenteras av den som iordningställer, administrerar eller överlämnar läkemedel
Iordningställande av läkemedel	Färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering.	Kontroller mot dokumenterad ordination: - patientens identitet - läkemedelsnamn eller aktiv substans - läkemedelsform - läkemedlets styrka - dosering - administreringssätt - administreringstillfällen Den som iordningställer ett läkemedel ska göra en rimlighetsbedömning av såväl den ordinerade som den iordningställda dosen.	Vid iordningställande och administrering eller överlämnande av ett läkemedel ska det i patientjournalen dokumenteras uppgifter om - vem som har iordningställt, administrerat eller överlämnat läkemedlet - när läkemedlet har iordningställts, administrerats eller överlämnats - vem som har utfört en kontroll av kontinuerlig infusion och tidpunkten för kontrollen - batchnummer (i vissa fall). Om aktiv substans har angivits i ordinationen eller om läkemedlet har bytts ut mot ett likvärdigt läkemedel, ska även namnet på det läkemedel som har iordningställts och administrerats eller överlämnats dokumenteras.
Administrering av läkemedel	Tillförsel av läkemedel till kroppen.	Kontroller mot dokumenterad ordination: - patientens identitet - läkemedelsnamn eller aktiv substans - läkemedelsform - läkemedlets styrka - dosering - administreringssätt - administreringstillfällen Vid kontinuerlig infusion av läkemedel ska kontrollen göras återkommande och vid varje tillfälle som ansvaret för administreringen övergår från en behörig hälso- och sjukvårdspersonal till någon annan sådan personal.	
Överlämning av läkemedel	Ett läkemedel som ska tillföras till en patient lämnas över till patienten själv eller till en tredje person som administrerar läkemedlet.	Samma kontroller som vid administrering av läkemedel.	

7.3 Vem har behörighet att delegera?

Även om det finns flera yrkesgrupper som har behörighet att iordningsställa, administrera eller överlämna läkemedel så är det endast läkare, tandläkare och sjuksköterskor som får delegera

arbetsuppgifterna till någon annan⁹. Förutom den formella kompetensen¹⁰ eller behörigheten måste den läkare, tandläkare eller sjuksköterska som delegerar också ha reell kompetens¹¹ för den arbetsuppgift som ska delegeras. Den arbetsuppgift som ska delegeras måste med andra ord ligga inom den delegerandes kompetensområde.

7.4 Ansvar på flera nivåer

Vårdgivaren (Region Skåne) har fördelat uppgift och ansvar angående beslut om delegering av iordningsställande, administrering och överlämnande av läkemedel till verksamhetschefen.

7.4.1 Ansvar för verksamhetschef

Verksamhetschefen har ansvar för att *Regional riktlinje för ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården i Region Skåne* är känd och följs i verksamheten. Verksamhetschefen har ett övergripande ansvar att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.

Verksamhetschefen har därmed ett ansvar för att beslut om delegering i verksamheten är förenliga med en god och säker vård samt är ytterst ansvarig för att delegering sker på ett korrekt och patientsäkert sätt inom verksamheten. Facklig samverkan avseende läkemedelshantering⁴ ska ske på den nivå där delegering och ansvar utövas, i enlighet med Region Skånes samverkansavtal.

Verksamhetschefen kan införa restriktioner i fråga om delegeringar i verksamheten, det vill säga bestämma att delegering av arbetsuppgifter inte ska förekomma.

Verksamhetschefen ansvarar i enlighet med ovanstående för att

- Säkerställa att det finns förutsättningar i verksamheten för den som mottar en delegering avseende iordningställande,

⁴ Med termen läkemedelshantering avses här iordningställande, överlämnande och administration.

⁹ 9 kap 2 § HSLF-FS 2017:37

¹⁰ Med formell kompetens avses legitimation för yrket eller godkänd högskoleutbildning som leder till yrkesexamen enligt särskild examensbeskrivning. Utöver sådan utbildning kan för vissa arbetsuppgifter formell kompetens förvärfvas genom för yrket fastställd specialistutbildning eller genom särskilda kurser inom yrket (enligt SOSFS 1997:14).

¹¹ Med reell kompetens avses att en person genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning har visat sig ha blivit reellt kompetent för den uppgift som avses att delegeras.

administrering och överlämnande av läkemedel att uppfylla de krav på kontroller och dokumentation som redovisas i tabell 2.

- Det inför varje beslut om delegering genomförs en riskanalys där berörda yrkesgrupper ingår. För metodstöd och mallar: [Patientsäkerhet - Vårdgivare Skåne](#).
- Beslut om delegering följs upp i verksamheten och omprövas minst årligen eller vid behov.
- Hålla sig fortlöpande underrättad om vilka delegeringsbeslut som finns i verksamheten
- Delegeringar som inte är förenliga med god och säker vård återkallas.
- Tillhandahålla en tillräckligt omfattande teoretisk och praktisk utbildning som beaktar samtliga krav och förutsättningar.
- Genomgången utbildning har dokumenterats i delegeringsbeslutet.
- Tillhandahålla en sammanställning över verksamhetens delegeringar till vårdgivaren vid förfrågan.
- Ha skriftliga och aktuella rutiner för alla moment i delegering av läkemedelshantering (Rutinerna ska täcka delegeringsbeslut, uppföljning, återkallelse och avvikelshantering).
- I de fall delegering av läkemedelshantering⁴ sker mellan personal i olika verksamheter, ansvarar verksamhetschefen för att det tydliggörs hur olika moment och ansvar fördelas mellan verksamheterna.

⁴ Med termen läkemedelshantering avses här iordningställande, överlämnande och administration.

7.4.2 Ansvar för den person som delegerar

Den som utfärdar en delegering ska ha formell och reell kompetens för den aktuella uppgiften. Reell kompetens innebär att ha kompetens att utföra den aktuella arbetsuppgiften i alla dess delar. Om reell kompetens saknas kan vederbörande inte delegera uppgiften till någon annan. Behovet av, och lämpligheten med delegeringen ska bedömas i samråd med verksamhetschef.

Den som delegerar en arbetsuppgift ansvarar för följande:

- Kontrollera att det finns förutsättningar i verksamheten för den som mottar en delegering avseende iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel att uppfylla de krav på kontroller och dokumentation som redovisas i tabell 2.
- Beskriva för mottagaren av delegeringen vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att kunna utföra arbetsuppgiften och förvissa sig om att mottagaren själv anser sig ha den kompetens som krävs. Om mottagaren anser att hen inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet av uppgiften får den inte delegeras.
- Ge mottagaren den handledning som behövs.
- Bedöma och försäkra sig om att uppgiftsmottagaren har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för uppgiften för att kunna utföra den på ett korrekt och säkert sätt.
- Bedöma och försäkra sig om att uppgiftsmottagaren har kunskap och kompetens för att uppfylla de krav på kontroller och dokumentation som redovisas i tabell 2.
- Tillse att den som tar emot uppgiften har dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen.
- Kontrollera och bevaka att den delegerade uppgiften fullgörs på ett sätt som är förenligt med god och säker vård.
- Ompröva delegeringsbeslut minst årligen, eller oftare om omständigheterna påkallar det.
 - Det kan exempelvis gälla vid omorganisering, förändrad bemanningssituation, om nya tekniker eller rutiner införs eller att mottagen får nya arbetsuppgifter som medför att hen inte längre bör fullgöra uppgiften.
 - Omprövning av beslut ska också ske när tiden för beslutet löpt ut.

- Återkalla delegeringen om mottagaren saknar förmåga att fullgöra uppgiften samt informera verksamhetschefen att så är gjort.
- Checklistorna: Checklista inför delegering och Checklista uppföljning av delegering ska användas. [Checklista inför delegering](#) samt [Checklista uppföljning av delegering](#)

7.4.3 Ansvar för mottagare av delegering

Den som mottar delegering ska på ett betryggande sätt sköta de delegerade uppgifterna. Den som tar emot en delegering avseende iordningställande, administrering eller överlämnande av läkemedel:

- Har ett eget ansvar för hur hen fullgör sina arbetsuppgifter inom ramen för det egna yrkesansvaret¹².
- Ska ha full insikt i det ansvar som följer en delegering och ska ha kunskaper om vad delegering och gällande bestämmelser för området innebär.
- Ska ha genomgått en teoretisk och praktisk utbildning om läkemedelshantering⁴.
- Ska ha generell kunskap om läkemedel och risker kopplade till läkemedel.
- Ska ha kontrollerad, konstaterad och dokumenterad reell kompetens (teoretisk och praktisk) för den delegerade uppgiften.
- Ska ha kunskap och möjlighet att genomföra de kontroller och dokumentera i patientjournalen de uppgifter som återges i tabell 2.
- Ska upplysa den som delegerar uppgiften om sin förmåga att fullgöra den aktuella uppgiften korrekt och säkert.
- Ansvarar för att det som hen meddelat den som utfärdat delegeringen beträffande sin förmåga att kunna fullgöra den aktuella uppgiften är korrekt.
- Ansvarar för att informera den som delegerat eller om det inte är möjligt, verksamhetschefen, om hen inte kan utföra arbetsuppgiften korrekt och säkert. Då ska delegeringen upphöra.

⁴ Med termen läkemedelshantering avses här iordningställande, överlämnande och administration.

¹² 6 kap. 2 § Patientsäkerhetslag (2010:659)

- Ska ha förmåga att bedöma patientens tillstånd och tillkalla behörig personal om det inte är lämpligt att utföra den delegerade uppgiften.
- Ska kunna svara på de frågor som patienten eventuellt har om det aktuella läkemedlet. Exempelvis läkemedlets effekt, bieffekter, risker eller hur läkemedlet ska intas (vid överlämnande).
- Ska vara införstådd i rapporteringsskyldigheten, och rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
- Får inte överlåta uppgiften till någon annan.
- Checklistorna: Checklista inför delegering och Checklista uppföljning av delegering ska användas. [Checklista inför delegering](#) samt [Checklista uppföljning av delegering](#)

7.4.4 Sjuksköterska med ansvar för patientens omvårdnad

På grund av en patients tillstånd eller andra rådande förhållanden kan den sjuksköterska som vid tillfället är ansvarig för patientens omvårdnad, bedöma att det inte är lämpligt att person med delegering utför den aktuella arbetsuppgiften. Då ska personen med delegering för uppgiften avstå från att utföra den.

7.5 Delegeringsbeslut – formalia och dokumentation

Delegeringsbeslutet upphör att gälla om den som mottagit delegeringen avslutar sin anställning eller byter vårdenhet. Ett delegeringsbeslut ska vara daterat, tidsatt och angivet när det ska följas upp. Beslutet ska bevaras i verksamheten i tio år efter det har upphört att gälla.

Ett delegeringsbeslut är personligt:

- Beslutet får endast avse en namngiven person, inte en yrkesgrupp eller funktion.
- Beslutet gäller endast för en angiven vårdenhet.
- Den person som fått en uppgift tilldelad sig genom delegering får inte i sin tur delegera uppgiften till någon annan.
- Bilaga 10 Blankett för delegeringsbeslut ska användas vid beslut om delegering. [Bilaga 10 Blankett för delegeringsbeslut](#)
- Beslutet ska innehålla
 - namn på den som utfärdat delegeringen och på den som tar emot delegeringen o uppgifter om kunskap och kompetens hos den som tar emot delegeringen

- uppgifter om giltighetstid
- datum för beslut
- uppgifter om när beslutet ska följas upp (minst årligen)
- Beslutet ska undertecknas av den som utfärdar delegeringen, den som tar emot delegeringen och av verksamhetschefen.

7.6 Delegering av läkemedelshantering mellan personal i olika verksamheter

- Det är möjligt för personal hos en vårdgivare att delegera läkemedelshantering⁴ till personal i en verksamhet som i sig inte omfattas av hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen. Förutsättningen är då att samarbetet mellan verksamheterna är utformat så att vårdgivaren är med och planerar, leder och kontrollerar läkemedelshandlingen⁴ som utförs i den andra verksamheten. Då gäller HSLF-FS 2017:37 för läkemedelshandlingen⁴ och vårdgivaren, där personalöverenskommelser beaktas, har vårdgivaransvaret för läkemedelshandlingen⁴. Vid delegering över huvudmannagränser ska eventuella samverkansavtal eller andra överenskommelser beaktas.
- Den som ska fatta ett delegeringsbeslut ska kontrollera att mottagaren har de kunskaper och den kompetens som krävs för att kunna utföra uppgiften på ett korrekt och patientsäkert sätt. Kontrollen av kunskap och kompetens ska göras utifrån vårdgivarens rutiner och syftar till att försäkra sig om att den som ska ta emot uppgiften har förutsättningar att fullgöra den.

7.7 Läkemedel som ej bör delegeras

Det finns läkemedel som ej bör delegeras på grund av stora patientsäkerhetsrisker, och till denna grupp hör till exempel narkotika, oavsett beredningsform. Läkemedel som administreras som injektioner och infusioner eller som kräver spädningsförfarande bör inte delegeras. SKR:s vägledning för högriskläkemedel ([Läkemedel och patientsäkerhet | Kunskapsstyrning vård | SKR](#)) beskriver några centrala läkemedel med risk för allvarliga konsekvenser vid felhantering.

⁴ Med termen läkemedelshantering avses här iordningställande, överlämnande och administration

8 Rekvisition, kontroll och förvaring av läkemedel

8.1 Rekvirering av läkemedel

Apoteket AB ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukvården i Region Skåne. Det omfattar tillhandahållande av läkemedel i hela förpackningar, beredning av cytostatika, sterila beredningar, patientindividuellt packade doser (PiD) samt hantering av kliniska provningar. Kliniska provningar hanteras av Apoteket, ApoEx, Oriola och Tamro. För regionens klinikinitierade studier måste Apoteket användas som leverantör.

Endast legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal godkända av verksamhetschef är behöriga att rekvirera läkemedel. Observera att den som rekvirerar läkemedel inte samtidigt ska vara kontrollansvarig för narkotikahanteringen.

8.1.1 Offentlig vård

Raindance Marknadsplats är Region Skånes e-handelssystem för beställning av läkemedel i hel förpackning. Via denna beställningsportal kan Region Skånes verksamheter beställa läkemedel och varor från Region Skånes leverantör av läkemedel samt Region Skånes leverantör av handelsvaror och material. För vacciner finns särskilda beställningsrutiner, se länk nedan. Verksamhetschef/enhetschef anger behörigheter för beställare, beslutsattestant och inleverans via beställningsformulär för Raindance Marknadsplats.

Ansökan om behörighet att beställa läkemedel och starta upp nytt läkemedelsförråd görs i Serviceportalen. Observera att för primärvård ska alla läkemedel som administreras i verksamheten beställas på rekvisition och alltså inte skrivas på recept (till exempel osteoporos- och järnpreparat) då upphandlingsrabatter finns.

Läs mer:

Bilaga 6 Uppdrag rekvirering av läkemedel

[Beställ läkemedel - Vårdgivare Skåne](#)

[Vägledning Region Skånes läkemedelsförsörjning](#)

[Beställa vaccin](#)

[Avtalade läkemedel i Region Skåne](#)

[Läkemedelsrådets rekommendationer](#)

8.1.2 Externa vårdgivare

För vårdleverantörer som har avtal med Region Skåne finns det möjlighet att köpa läkemedel via Apoteket till Region Skånes avtalade priser. Läkemedelsbeställningar görs då via Apotekets beställningssystem Vårdshopen.

För att skapa en ny behörighet för beställning av läkemedel i Vårdshopen eller vid ändring av befintliga, beställande enheter och/eller behöriga beställare, används Apotekets ansökningsformulär [”Ansökan bli kund”](#).

Läs mer:

[Beställa vaccin](#)

[Avtalade läkemedel i Region Skåne](#)

8.1.3 Reservrutin

Vid IT- avbrott som hindrar åtkomst till beställningssystemen, ska reservrutin användas. Då används blanketten ”Beställningsblankett för läkemedelsrekvisition”. Blanketten bör vara utskriven och tillgänglig i rutinpärm eller dylikt.

Läs mer:

[Beställ läkemedel - Vårdgivare Skåne \(se reservblankett för beställning\)](#)

8.1.4 Extempore-läkemedel

Cytostatika, övrig steril och icke-steril extempore beställs via:

- Cytodos
- CytoBase
- Apotekets beställningsportal

För mer information gällande manuella beställningar via Apotekets beställningsportal se riktlinje ”Vägledning läkemedelsförsörjning”.

För lagerberedningar och frekventa extemporeläkemedel har produktmonografier utarbetats tillsammans med specialister. För läkemedel med beviljad rikslicens finns även produktresuméer som godkänts av Läkemedelsverket. Dessa beredningar ska vanligen beställas via Marknadsplatsen. Om varan saknas kontaktas Apoteket.

Läs mer:

[Beställ läkemedel - Vårdgivare Skåne](#) (se beställning av sterila läkemedel och cytostatika)

Produktresuméer, produktmonografier, preparatförteckningar, aktuell produktinformation samt information om tillgängliga doseringshjälpmedel se:

[APL](#)
[Unimedic](#)

8.1.5 Rekvisition och lån mellan avdelningar

Vid lån av läkemedel mellan avdelningar bör endos, blister eller annan originalförpackning lämnas ut. Om detta inte går läggs tabletter/kapslar i en läkemedelspåse.

Utlånande sjuksköterska eller farmaceut ansvarar för iordningställande och fyller i läkemedlets namn och styrka, utgångsdatum samt datum och signum på läkemedelspåsen samt överlämnar läkemedlen. Observera att särskilda regler gäller för narkotika, hänvisning till [8.6](#).

Läkemedelspåsar är inte till för långtidsförvaring av läkemedel, ange datum när läkemedel läggs i påsen. Låna endast den mängd läkemedel som beräknas för aktuellt vårdtillfälle.

8.1.6 Restnoteringsinformation

Ett läkemedel kallas restnoterat när det under en period inte går att beställa från tillverkaren, det vill säga när innehavaren av godkännande för försäljning av läkemedlet inte kan leverera det. Alternativt föreligger en fördröjning i grossist-/leverantörsledet. Det kan finnas flera olika anledningar till att ett företag tillfälligt inte kan leverera ett läkemedel, till exempel problem i tillverkningen, brist på aktiv substans eller att efterfrågan på läkemedlet blir oväntat hög. Restnoteringsinformation kommuniceras kontinuerligt på intranätet och Vårdgivare Skåne.

Läs mer:

[Restnoterade läkemedel - Vårdgivare Skåne](#)

[Läkemedelsverkets lista över aktuella restnoteringar](#)

8.1.7 Rekvisition av licensläkemedel

Förskrivande läkare måste registrera en licensmotivering via Läkemedelsverkets licenssystem KLAS.

Apoteket gör därefter licensansökan. Handläggningstiden är normalt inom 7 arbetsdagar. Om ärendet är medicinskt brådskande markeras detta i licensmotiveringen.

Licensmotiveringen ska riktas till Apoteket Skåne som apotek om läkemedlet ska rekvireras till verksamheten.

När licensen är beviljad registrerar Apoteket detta, varpå beställning är möjlig. Vissa licensläkemedel måste anskaffas internationellt, denna process kan ta någon till några veckor.

Om beställande enheter skickar beställning på licensläkemedel men saknar licens kommer denna orderrad avslås, det vill säga plockas bort från ordern. Apoteket återkopplar detta till beställaren. Kontakta Apoteket via e-post på kundcentrum@apoteket.se om det inte går att finna en licensvara i beställningssystemet Raindance Marknadsplats/Vårdshopen.

Läs mer:

Om licensläkemedel, hänvisning till [4.4](#)

[Licensläkemedel - Vårdgivare Skåne](#)

[Läkemedelsverkets föreskrifter om licens \(HSLF-FS 2018:25\)](#)

8.1.8 Rekvisition av medicinska gaser

Varje rekvirering av medicinsk gas på flaska ska göras skriftligt (elektroniskt eller manuellt). Muntlig beställning, exempelvis beställning direkt ifrån gasförråd, bör enbart tillämpas som nöd-/akutrutin.

Rekvirering av medicinsk gas får bara utföras av behörig person. Abonnemang kan tillämpas, förutsatt att rutinen för detta är skriftligen godkänd av verksamhetschef (eller av denne utsedd person) och levererande enhet.

Följande uppgifter ska dokumenteras vid rekvirering av gas:

- Beställarens namn, tillhörighet, RSID samt mottagande enhet i klartext.
- Gas-sort, typ av flaska (exv. Viproxal), volym/storlek samt antal.
- Ändamål om detta inte är självklart (medicinsk eller teknisk gas).
- Överenskommen leveranstid.

Informationsruta 27

Läs mer:

[Gas - beställning](#)

Bilaga 5 Uppdrag och funktionsbeskrivning gasansvarig

Bilaga 6 Uppdrag rekvirering av läkemedel

Förvaring av medicinska gaser, hänvisning till [8.4.4](#)

8.1.9 Läkemedel för klinisk prövning

I Region Skåne finns ett kompetenscenter för kliniska prövningar; Forum Söder, med ansvar att stödja forskare i södra sjukvårdsregionen. Forum Söder är även delegerad ansvar för att säkerställa kontraktsskrivning mellan Region Skåne och företagssponsor för prövningsuppdraget och detta utförs i tätt samarbete med den kliniska verksamheten. Om läkemedelshanteringen för den kliniska prövningen ska hanteras via Region Skånes avtalade läkemedelsleverantör Apoteket, ska särskilt avtal upprättas för varje enskild prövning mellan sponsor och avtalad läkemedelsleverantör inom kliniska prövningar.

Läs mer:

[Forum Söder](#)

[Vägledning Region Skånes läkemedelsförsörjning](#) (se avsnitt 3.8)

8.1.10 Antidoter

Vid överdosering av vissa läkemedel kan, förutom vanliga åtgärder vid förgiftningar, specifika antidoter sättas in.

Behandlingsanvisningar finns på Giftinformationscentralens hemsida, där finns även ett antidotregister över sjukhusens lagerhållning av antidoter.

Giftinformationscentralen bör kontaktas vid minsta tveksamhet.

- Akut, ring via 112, begär giftinformation.
- I mindre akuta fall 010-456 6700.

Informationsruta 28

Läs mer:

[Giftinformationscentralen](#)

[Giftinformationscentralen – sök substans och åtgärd](#)

8.2 Mottagning av läkemedelsbeställning

8.2.1 Leverans

Uttransport av läkemedel till samtliga Region Skånes vårdenheter och externa vårdgivare sker enligt befintliga avtal. Transportboxarna innehåller läkemedel eller läkemedelsnära varor som kan vara stöldbegärliga, temperaturkänsliga och/eller mycket dyrbara. Därför får transportboxar aldrig lämnas okvitterade eller i allmänna utrymmen.

8.2.2 Kontroll av leverans

Läkemedelsleveransen ska överlämnas till behörig person, som ska kvittera leveransen. Läkemedlen ska om möjligt packas upp genast (särskilt om kylvaror har rekvirerats) och placeras i läkemedelsförrådet. Följesedeln följer med varorna och kontrollen sker lämpligen mot denna.

Vid uppackning gäller följande:

Kontrollera

- att plomberingen är obruten
- att läkemedlen överensstämmer med gjord rekvisition
- om leveransen innehåller eventuella ändringar så som t.ex. delleveranser eller restsituationer.

Tillse att

- den person som packar upp leveransen eller delar av leveransen, daterar och signerar åtgärden på följesedeln
- alla följesedlar sparas för inleverans i Marknadsplatsen så att faktureringen av beställningen blir korrekt
- inleverans görs snarast av behörig läkemedelsbeställare
- Följesedlar sparas på avdelningen i 2 år. Obs! PiD följesedlar innehållande narkotika som signerats i samband med kassation av narkotika i dospåsar eller vid flytt av patient till annan enhet ska sparas i 15 år då de räknas som narkotikajournal.
- följesedlar för normalbeställningar via e-handel hanteras enligt "Rutin för mottagningskontroll för inleverans"
- eventuella anmärkningar görs omgående eller senast vardagen därpå till läkemedelsleverantören för rättelse
- tomma läkemedelsboxar så fort som möjligt returneras till läkemedelsleverantören.

Informationsruta 29

Läs mer:

[Beställ läkemedel - Vårdgivare Skåne](#) – Vägledning Region Skånes läkemedelsförsörjning
Bilaga 15/16 Stödmall för lokal instruktion

8.3 Returer

Alla boxar som skickas för returer av olika slag, ska vara märkta med returetikett. För mer information och detaljer, se Vägledning Region Skånes läkemedelsförsörjning.

8.3.1 Indragningar

En indragning innebär att ett läkemedel dras tillbaka från marknaden. Detta sker om ett läkemedel bedöms kunna skada eller skapa obehag för användaren. En indragning kan gälla specifika batcher eller hela produktionen.

Indragningens allvarlighetsgrad avseende hälsorisk klassificeras i tre klasser:

Klass I: Användning kan vara livshotande eller ge allvarlig skada. ApoEx kommunicerar i första hand via telefon till de enheter som köpt varan.

Klass II: Användning kan orsaka sjukdom eller felbehandling, utan att vara livshotande. ApoEx kommunicerar med berörda enheter.

Klass III: Användning medför ingen påtaglig hälsorisk. Produkten dras in av annan orsak. ApoEx kommunicerar med berörda enheter.

Informationsruta 30

8.3.2 Läkemedel för destruktion

Information gällande destruktion av läkemedel med utgången hållbarhet eller som av annan anledning ska kasseras finns i Vägledning Region Skånes läkemedelsförsörjning samt sorteringsguiden för läkemedelsavfall.

Läs mer:

[Beställ läkemedel - Vårdgivare Skåne](#) – se Vägledning Region Skånes läkemedelsförsörjning
[Läkemedelsavfall - hantering - Region Skånes intranät](#)

8.4 Förvaring av läkemedel

Läkemedel ska förvaras:

- oåtkomliga för obehöriga.
- enligt tillverkarens anvisningar.
- på ett sådant sätt att deras kvalitet inte försämras.
- i ett särskilt läkemedelsförråd som är anpassat för verksamhetens inriktning och omfattning.

Informationsruta 31

8.4.1 Läkemedelsförråd

För att tillmötesgå kraven på en god hygien och arbetsmiljö ska ett speciellt läkemedelsförråd finnas. Läkemedelsförrådet ska endast användas för förvaring av läkemedel inklusive tillbehör samt för iordningställande av läkemedel.

Kraven på läkemedelsförrådets funktion och utrymme varierar beroende på enhetens inriktning och rutiner för förvaring och iordningställande av läkemedel. God belysning och ostörd miljö är viktigt ur säkerhetssynpunkt. Tillträde till läkemedelsförråd har endast sjuksköterska/annan behörig personal i tjänst. Vid städning, reparationer eller underhållsarbete skall läkemedelsförrådet kontrolleras av sjuksköterska/ annan ansvarig person. Personer som ges tillträde till läkemedelsrummet ska kunna uppvisa giltig id-handling och får inte vistas där utan närvaro av behörig person.

Åtgärder ska vidtas så att daglig städning genomförs. Detta är viktigt ur hygien- och patientsäkerhetssynpunkt. Läkemedelsboxen och annat ovidkommande får inte placeras på arbetsbänkar eller där tillredning av sterila läkemedel utförs.

Av säkerhetsskäl ska aldrig personliga ägodelar så som klädesplagg, väskor etc. förvaras i läkemedelsförrådet. Medel för tekniskt bruk (dvs. rengöringsmedel, desinfektionslösningar för lokaler och tillbehör samt reagenser) får inte heller förvaras i läkemedelsförråd, utan ska förvaras i annat låst utrymme. Undantag är de medel som krävs för avtorkning av läkemedelsrummets beredningsytor.

8.4.1.1 Läkemedelsförråd på sjukhus

Läkemedel lagras på avdelning/enhet i läkemedelsförråd och detta kan ske enligt följande alternativ:

- **Läkemedelsrum**

I detta finns till exempel öppna hyllor, kylskåp, låst skåp för narkotika samt plats för vätskevagn/infusionsvätskor, sprutor och kanyler och andra hjälpmedel för iordningställande av patientdos. Fördelar med detta är

- att förvaring kan ske på öppna hyllor med god överskådlighet
- att arbetet kan utföras ostört
- att endast en nyckel/kort behövs för hela förrådet.

- **Läkemedelsskåp/Läkemedelskylskåp**

Dessa skåp kan vid behov kompletteras med låsbart förvaringsutrymme för vätskor (infusionsvätskor, spolvätskor, lösningar för hudinfektion).

- **Läkemedelsvagn**

Läkemedelsvagnar betraktas som förråd. De ska vara låsta och förvaras säkert när de inte används. Lådorna i vagnen är oftast patientbundna. Begränsa om möjligt uttagen från läkemedelsförrådet till läkemedelsvagn för att undvika felhantering och förväxlingar. Följande gäller för att få flytta tillbaka blister/endos/ampull till läkemedelsförrådet:

- Blisterkartan ska vara hel, all märkning ska vara kvar.
- Endos/ampull är märkt med alla uppgifter (namn, utgångsdatum, batchnummer).
- Blisterkartan/endos/ampull får aldrig läggas tillbaka i originalförpackning då det är stor risk att den läggs i fel förpackning med felmedicineringar som följd.
- Blisterkarta/endos/ampull läggs framför originalförpackningen i läkemedelsförrådet.

Informationsruta 32

Om verksamheten väljer ett annat arbetssätt för hanteringen av blisterkartor, måste detta tydligt beskrivas i den lokala instruktionen och säkerhetsåtgärder vidtas så att felmedicinering undviks. Vissa lådor kan disponeras för de vanligaste läkemedlen, som ordineras generellt eller vid behov, och för sprutor och andra hjälpmedel mm. När en avdelning stängs ska läkemedelsvagnen förvaras inlåst och vid behov tömmas.

- **Vätskevagn**

Vätskevagn är en speciell vagn som innehåller infusions- och spolvätskor. Läkemedelsleverantören går igenom och kompletterar vagnen efter ett rekvisitionsunderlag som tagits fram på avdelningen/enheten.

Byte av vagn sker enligt överenskommelse med läkemedelsleverantören. Full vagn levereras och den tömda vagnen går i retur.

Systemet innebär att man på avdelningen inte behöver beställa vätskor själv samt slipper tomemballage och tunga lyft. Vagnen ska förvaras säkert, till exempel i läkemedelsrum, där den då ersätter en hyllmodul. Varje avdelning ansvarar själv för underhåll och rengöring av vätskevagn.

- **Gemensamt läkemedelsförråd**

80 % av de läkemedel som beställs till en avdelning ingår i bassortimentet och används frekvent.

Resterande 20 % beställs för ett visst ändamål, till exempel en viss patient. Dessa läkemedel riskerar att inte komma till användning på avdelningen inom angiven hållbarhetstid, och därmed kasseras när hållbarhetstiden går ut.

En av tankarna med gemensamma läkemedelsförråd (tidigare svansförråd) är att ta tillvara överblivna läkemedel som inte ingår i avdelningens bassortiment, så att övriga avdelningar vid behov kan använda dessa läkemedel i stället för att rekvirera nya. Detta ger ökad tillgänglighet, ökade miljövinster, minskar kassation och ger minskade kostnader för läkemedel. I gemensamma läkemedelsförråd kan det också finnas ett fastställt sortiment av sällanläkemedel.

Läs mer:

[Beställ läkemedel](#)

8.4.1.2 Läkemedelsförråd i primärvård och kommunal vård

I primärvård och i kommunal hälso- och sjukvård kan ett läkemedelsförråd vara:

- Förråd för akut- eller jourläkemedel.
- Förråd för iordningställande av läkemedel till personer på ett kommunalt boende och/eller läkemedel ordinerade enligt generella direktiv för läkemedelsbehandling.

- Förråd med individuellt förskrivna läkemedel för fler än en person, hänvisning till [8.4.6](#).

Läs mer:

Bilaga 12: Blankett för namnteckning och signatur

Bilaga 11: Anvisningar och protokoll för skötsel av läkemedelsförråd

Bilaga 13: Blankett för temperaturkontroll

Bilaga 5a: Förvaring och kontroll av medicinsk gasflaska på enhet

8.4.2 Förvaringsanvisningar för läkemedelsförråd

8.4.2.1 Gruppordning

Förvaring sker enligt tillverkarens anvisningar. Läkemedlen ska placeras i: bokstavsordning eller i ATC-ordning och lämpligen utifrån nedanstående grupper:

- Läkemedel för injektion.
- Övriga läkemedel för invärtes bruk.
- Läkemedel för utvärtes bruk.
- Läkemedel som kräver kylskåp/ sval.

Informationsruta 33

Läs mer:

[ATC-register FASS](#)

8.4.2.2 Förväxlingsrisk

En del läkemedel har likartade namn och förpackningar med snarlikt utseende och det finns då en risk för förväxling. Därför är det viktigt att märka upp läkemedlets plats på hyllan. Läkemedelsansvarig sjuksköterska och personal från Läkemedelsservice (om tjänsten finns i verksamheten) ansvarar för att märkningen av läkemedlens förvaringsplats är tydlig. Det är viktigt att regelbundet se över förvaringen av läkemedel i läkemedelsförrådet för att identifiera och minimera risker för förväxlingar av läkemedel.

8.4.3 Kassationshantering infusioner

Använda infusionspåsar som ska kasseras får ej tas in i läkemedelsrummet. De ska läggas i riskavfallsbehållare placerad i skölj eller liknande rum.

Undantaget är infusionspåsar innehållande narkotika som bör kasseras i läkemedelsrum. Undantag kan göras i lokal instruktion.

8.4.4 Förvaring av medicinska gaser

Medicinska gaser är läkemedel. Det innebär bland annat att:

- medicinska gaser ska förvaras oåtkomligt för obehöriga och regelbundet kontrolleras avseende förvaringssätt och hållbarhet.
- doseringsanordningen på apparaturen måste vara sådan, att gasflödet i liter per minut kan avläsas.
- användning alltid måste föregås av en ordination.

Informationsruta 34

Medicinska gaser är fyllda i vita flaskor med färgmarkering på "flaskbrösten" som anger gassort:

Vit: Andningsoxygen

Svart/vit: Andningsluft

Blå: Lustgas

Grå: Koldioxid

På flaskan finns etiketter där det framgår gassort, fyllningsdatum, och uppgift om sista förbrukningsdatum. Flaskor med oläslig etikett ska reklameras och returneras.

För förvaring och hantering av gasflaskor gäller bland annat följande:

- Varningsskylt för gasflaskor ska finnas både på dörren till förvaringsutrymmet och på entrén till vårdenheten.
- Förrådet där flaskorna förvaras ska vara välventilerat.
- Inga absorberande material som exempelvis textilier får förekomma i förrådet.
- Fett och olja kan självantändas i andningsoxygen under högt tryck och därigenom orsaka explosion och brand. Fett eller oljor får därför inte lagras på samma ställe som gasflaskor eller förekomma på händer eller apparatur vid hanteringen.
- Fylld gasflaska får inte utsättas för onormal uppvärmning.
- Flaskorna ska vara fastkedjade vid vägg eller på speciell kärra.
- Olika gassorter förvaras åtskilda.
- Tomma och fyllda flaskor förvaras åtskilda på uppmärkt plats.
- På varje enhet där lösa gasflaskor används ska det finnas en förteckning över var gasflaskorna förvaras.
- Instruktioner för den praktiska hanteringen av medicinska gaser ska finnas lättillgängliga på enheten.

- Öppen eld får inte förekomma där behandling med andningsoxygen pågår.
- Särskilda regler gäller för hantering av anestesigaser.

Hanteringen av medicinska gaser ska, liksom läkemedelsförrådet, kvalitetsgranskas. Ansvar för enhetens hantering av medicinska gaser ska beskrivas i enhetens lokala instruktioner för läkemedelshantering.

Läs mer:

Bilaga 5: Uppdrag och funktionsbeskrivning gasansvarig,

Bilaga 5a: Förvaring och kontroll av medicinsk gasflaska på enhet.

[Gas - beställning - Region Skånes intranät](#)

[Vårdhandboken, oxygenbehandling](#)

[Vårdhandboken, Hur länge räcker gasflaskan?](#)

[Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anestesigaser](#)

Dokumentation i läkemedelsmodulen gällande medicinsk gas:

[Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior \(under A. Rutiner\)](#)

8.4.5 Temperaturmätning

I utrymme där läkemedel förvaras ska temperaturen kontrolleras och dokumenteras regelbundet.

Termometrar som används ska mäta min- och maxtemperatur samt vara tillförlitliga och mäta rätt temperatur. Termometrar bytes, kontrolleras eller kalibreras årligen. Rumstemperatur ska kontrolleras och dokumenteras minst en gång per vecka. Temperatur i kylskåp (gäller även kylskåp med larm) och eventuellt frysskåp ska kontrolleras och dokumenteras dagligen. Avläst temperatur ska dokumenteras på lista som arkiveras i ett år.

Vid konstaterande att läkemedel förvarats vid annan temperatur än rekommenderad ska respektive läkemedelsföretag kontaktas för bedömning av huruvida läkemedlets hållbarhet påverkats.

Kontaktuppgifter till läkemedelsföretag finns på [Företag A-Ö - FASS Vårdpersonal](#).

För enheter som förvarar spol-/infusionsvätskor i värmeskåp ska det finnas lokala instruktioner för temperaturavläsning, lagringstid och temperaturintervall.

8.4.5.1 Rumstemperatur

Läkemedel som måste förvaras vid rumstemperatur ska förvaras vid (+15°C - +25°C). Läkemedel kan få förändrad effekt vid förvaring under

+15°C. Detta beror på utfällning av aktiv eller annan substans i lösningar (till exempel Gaviscon mixtur) eller på partikeltillväxt i suspensioner (kortikosteroider för injektion) om de placeras i kylskåp. Andra följder är dosaerosoler som inte fungerar och lösningar som blir för trögflytande.

8.4.5.2 Kylförvaring

Vissa läkemedel kräver kylförvaring (+2° - +8°). Det anges på läkemedelsförpackningen. Avfrostning av kylskåpet ska göras vid behov.

Temperaturen varierar mellan olika platser i kylskåpet och i kylskåpsdörren är den i allmänhet för hög för känsliga preparat (till exempel vacciner). I medicinkylskåpet får endast läkemedel förvaras.

8.4.5.3 Frysförvaring

Om läkemedlet ska frysförvaras ska det förvaras vid den frystemperatur som finns angiven på förpackningen.

Läs mer: Bilaga 13: Blankett för temperaturkontroll

8.4.6 Läkemedelsförvaring för enskild patient

8.4.6.1 I slutenvård/primärvård/särskilt boende

Förvaringsutrymme för läkemedel tillhörande enskild patient räknas inte som läkemedelsförråd. När individuellt förskrivna läkemedel till fler än en patient förvaras samlat ska detta utrymme räknas som läkemedelsförråd. Vårdgivaren är då ansvarig för utrymmet.

Om enskild patients läkemedel förvaras på enheten ska det förvaras inlåst. När läkemedel för enskild patient finns i ett samlat förråd ska de förvaras tydligt åtskilda från varandra och vara märkta med namn och personnummer.

8.4.6.2 Läkemedel för vård i hemmet

Läkemedel ska förvaras på en säker plats i patientens bostad. Läkemedel ska förvaras så att det inte finns risk för att obehöriga kan komma åt dessa. Sjuksköterskan måste i varje enskilt fall göra en bedömning gällande förvaring av läkemedel. I de fall sjuksköterskan finner en risk med att läkemedel inte förvaras inlåsta, ska patienten eller anhöriga informeras och läkemedelsskåp om möjligt ordnas.

När det finns ordination på narkotikaklassade läkemedel rekommenderas att dessa förvaras i ett låst läkemedelsskåp. Tänk särskilt på de risker som åtkomst till läkemedel eller läkemedelsavfall kan innebära för barn och husdjur. Lokal instruktion för vårdpersonals hantering av narkotika i hemmet ska finnas. Iakttag särskild försiktighet vid kassation av smärtplåster, hänvisning till [6.5.4.](#)

8.5 Förvaring av läkemedel utanför läkemedelsförråd

Under förutsättning att det är förenligt med säker hantering, får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga förvaras utanför läkemedelsförrådet.

I den lokala instruktionen för läkemedelshantering ska det framgå vilka läkemedel som bedöms kunna förvaras utanför läkemedelsförrådet.

En förteckning över vilka läkemedel som förvaras utanför läkemedelsförrådet behövs bland annat som underlag för läkemedelsbeställningar och hållbarhetskontroller.

8.5.1 I vårdsalen

Vid patientens säng kan undantagsvis förvaras sådana läkemedel som patienten är väl förtrogen med och själv får inta. Läs mer om under vilka förutsättningar detta får ske, hänvisning till [6.5.8.](#)

8.5.2 Akutvagn/väska/ask

För livshotande situationer ska akutläkemedel finnas tillgängligt på varje avdelning/mottagning där läkemedelsbehandling utförs.

Dessa måste förvaras så att de är lätt åtkomliga i den akuta situationen. Samtidigt måste placeringen dock väljas så att stöldrisk minimeras, läkemedlen ska vara under ständig uppsikt. När en akutask brutits skall den omedelbart kompletteras eller bytas. Det är viktigt att säkerställa att rutin finns för plombering av akutvagn/väska/ask och kontroll av intakt plombering. Varje akutvagn/väska/ask ska ha en separat narkotikajournal/förbrukningsjournal för att underlätta inventering och för att snabbt upptäcka avvikelser.

Innehållet i akutvagn/väska/ask ska utarbetas utifrån respektive verksamhetsbehov.

Ansvar för iordningställande av akutvagn/väska/ask samt information om dess innehåll och dosrekommendationer ska finnas i lokal instruktion för läkemedelshantering.

Läs mer: Bilaga 15/16: Lokal instruktion för läkemedelshantering

8.6 Tillförsel, förbrukning och kassation av narkotiska läkemedel

8.6.1 Registrering

För att underlätta hanteringen ska förbrukningsjournalen ha plats för patientens ID-etikett. Enheter som använder Meliors läkemedelsmodul och Zebra etikettskrivare, bör använda dessa etiketter i narkotikajournalen. Vid utlån till annan enhet se [8.6.3 Lån mellan enheter](#).

Vid **tillförsel** till förrådet anges följande i förbrukningsjournalen:

- Datum.
- Klockslag.
- Tillförd mängd från apoteksleverans eller i akutsituation lånad mängd från annan avdelning.
- Kontrollerad behållning efter tillförsel.
- Eventuell brist eller överskott i anmärkningskolumnen.
- Sjuksköterska eller annan behörig styrker uppgifterna med namnteckning och RSID.

Informationsruta 35

Vid **uttag** från förrådet anges följande i förbrukningsjournalen:

- Datum
- Klockslag
- Uttagen mängd
- Patientens namn och personnummer
- Kontrollerad behållning efter uttag
- Eventuell brist eller överskott i anmärkningskolumnen
- Kasserad mängd i anmärkningskolumnen om patient ges mindre mängd än en enhet (ampull, suppositorium, tablett)
- Sjuksköterska eller annan behörig styrker uppgifterna med namnteckning och RSID

Informationsruta 36

Enheter med narkotikaautomat lägger till nya patienter som ”tillfällig patient” i narkotikaautomaten när första uttaget till den patienten görs, därefter registreras alla uttag, returer eller kassation på patienten i automaten enligt manual för automaten.

Läs mer:

Bilaga 4, Uppdrag och funktionsbeskrivning kontrollansvarig sjuksköterska/farmaceut.

Bilaga 4a, Checklista för kontroll och inventering av narkotika.

Bilaga 14, Blankett vid lån av narkotikaklassade läkemedel.

8.6.2 Förvaring av narkotika

Narkotika ska alltid förvaras inlåst, åtkomst via kortläsare/SITHS-kort. Om vårdgivaren eller vårdenheten beslutar om att extra säkerhetsåtgärder behöver vidtas kan ett separat låsbart skåp med kortläsare installeras.

Läkemedelsautomater ger ytterligare bättre spårbarhet.

Läkemedelsautomater ska förvaras i låsta utrymmen dit åtkomst loggas via kortläsare/SITHS-kort. Inloggning i läkemedelsautomaten sker med RSID + lösenord (kommer ändras till SITHS-kort).

Patients medhavda läkemedel innehållande narkotika ska förvaras inlåst och separata narkotikajournaler upprättas för varje förpackning och patient. Dubbelsignering vid tillförsel och när patient skrivs hem. Uttag under vårdtiden hanteras på sedvanligt sätt för narkotiska preparat. Lokala instruktioner behöver upprättas.

Stängda avdelningar - Töm avdelningen på narkotikaklassade läkemedel när avdelningen stänger och avvakta med att beställa narkotikaklassade läkemedel tills inflyttning.

Om narkotika förvaras utanför läkemedelsrummet, ska separat narkotikajournal föras.

8.6.3 Lån mellan enheter

Lån av narkotika mellan vårdenheter ska i möjligaste mån undvikas. För att säkerställa hanteringen vid lån av narkotikaklassade läkemedel ska särskilt framtagna blankett "Blankett vid lån av narkotikaklassade läkemedel" användas. Detta gäller även då narkotiska läkemedel följer med patient vid flytt mellan enheter.

Om PiD dospåsar som innehåller narkotika skickas med patienten dokumenteras detta på följesedeln samt i överflyttningsanteckning i Melior. Följesedeln ska alltid sparas på den avdelning som beställt PiD och dit PiD levererats.

För en säker hantering vid lån av narkotika gäller följande:

Före överlämning ska

- rekvirerande enhet ange namn och RSID på ansvarig sjuksköterska vid telefonsamtal till utlånande enhet
- namn på bud och RSID anges om annan än rekvirerande sjuksköterska ska hämta läkemedlet
- blankett för lån fyllas i av sjuksköterska på utlånande enhet
- mängden narkotika förtydligas med bokstäver.

Vid överlämning ska

- den som hämtar läkemedlet legitimera sig med sitt RS-kort (e-tjänstekort) och utlånande sjuksköterska signera kontrollen på blankett för lån.
- ansvarig sjuksköterska på utlånande enhet bekräfta rekvisitionens riktighet med sin namnteckning.

Vid mottagande ska

- ansvarig sjuksköterska på rekvirerande enhet kontrollera att läkemedel och utlåningsblankett överensstämmer samt signera riktigheten.

Gällande dokumentation ska

- det lånade läkemedlet skrivs ut från förbrukningsjournalen från utlämnande avdelning/enhet och signeras av bud och utlämnande sjuksköterska, samt skrivs in och signeras i den hämtande avdelningens/enhetens förbrukningsjournal så att man enkelt kan följa lån av kontrollläkemedel mellan avdelningar/enheter. Ingen patientdata ska dokumenteras utan utlånet förs in i saldot hos inlånande enhet och därefter görs uttaget till aktuell patient.
- både utlånande enhet och lånande enhet ska dokumentera samt arkivera var sin del av utlåningsblanketten i 15 år. Blanketten förvaras i en pärm eller tillsammans med förbrukningsjournalen för narkotika.

Om annan rutin än denna ska gälla, ska det framgå av den lokala instruktionen för läkemedelshantering.

Om narkotika lånas ut från enhet med narkotikaautomat, ska den lånande enheten läggas in som tillfällig patient i narkotikaautomatens patientlista och narkotikan tas ut mot denna. Låneblankett fylls i som vanligt.

Om narkotika hämtas från gemensam läkemedelsautomat registreras uttaget i den gemensamma automaten på enheten som hämtar. På enheten förs uttaget in i narkotikajournal som narkotika hämtat från gemensamt förråd/ serviceförråd och uttag registreras på patient som vanligt.

Läs mer:

Bilaga 14, Blankett vid lån av narkotikaklassade läkemedel

Bilaga 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering

8.6.4 Kassation av narkotika

Kassation av narkotika sker enligt Region Skånes avfallshandbok, information finns här: [Läkemedelsavfall - hantering](#).

All kassation av narkotika ska bevittnas och dokumenteras i förbrukningsjournalen samt dubbelsignering ska göras. Undantagsvis kan en av dessa personer vara undersköterska för att undvika mellanlagring i väntan på kassation.

Kassation av narkotika i dospåsar, PiD, ska dokumenteras på följesedeln. Bredvid patientens personuppgifter skrivs "kasseras" och signeras av den person som utför kassationen samt dubbelsigneras. Om följesedeln av någon anledning saknas används i stället [Bilaga 18: "Journal för kassation av narkotika i dospåsar"](#).

Om narkotika uttaget från gemensam automat ska kasseras sker det på enheten som hämtat enligt ovanstående text.

Uttag av narkotika som är gjorda från narkotikaautomat kasseras via narkotikaautomatens procedur för kassation, vittne krävs. Själva läkemedlet kasseras enligt Region Skånes avfallshandbok, inte i automatens returlåda.

Inkurant narkotika i läkemedelsautomater kasseras enligt läkemedelsautomat manualen för kassation på grund av hållbarhet. Själva läkemedlet kasseras enligt ovan.

8.6.5 Narkotikakontroll

Kontrollräkning av narkotika klass II – V görs av sjuksköterska/farmaceut utsedd av enhetschefen. Denna person ska av säkerhetsskäl inte vara läkemedelsbeställare. I uppdraget ingår att kontrollera lagersaldon i alla förråd mot förbrukningsjournal minst en gång per månad. Verksamhetschef tar beslut om inventering ska göras mer frekvent. Detta ska då anges i den lokala instruktionen. Stickprovskontroller av anteckning i förbrukningsjournal mot ordination i patientjournal samt införsel i förbrukningsjournal mot aktuellt beställningssystem (tex Marknadsplatsen) ska genomföras. Om narkotika har kasserats (till exempel vid utgången hållbarhet) ska det kontrolleras att detta har dubbelsignerats i förbrukningsjournal. Om lån från eller till enheten förekommit ska dokumentationen kontrolleras.

Utförda kontroller antecknas i respektive preparats förbrukningsjournal. Arkivering av narkotikajournal bör ske på ett för ändamålet avsedd plats, vilket bör vara oåtkomligt för personal (ej läkemedelsrum). Förbrukningsjournaler arkiveras i 15 år och kan vid behov (t. ex platsbrist) lagras på central nivå. Uppföljning av att rutiner följs sker genom den årliga webbaserade kvalitetsgranskningen.

Narkotikakontroll i läkemedelsautomater görs i rapportsystemet MedX ([MedX Region Skåne](#)) på samma sätt som ovan beskrivet. Utökad behörighet krävs.

Uttag från gemensamma automater kontrolleras enligt förvaltningsövergripande överenskommelse. Exempelvis kan enhetens uttagshistorik av narkotika (utan personuppgifter) mailas till ansvarig enhetschef eller kontrollansvarig sjuksköterska för kontroll. Om djupare kontroll behöver göras kontaktar enhetschef eller kontrollansvarig sjuksköterska den gemensamma automatens kontrollfarmaceut/ sjuksköterska för mer information.

Läs mer:

Bilaga 4a, Checklista för kontroll och inventering av narkotika.

Bilaga 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering

[Gallringsbeslut avseende handlingar rörande förrådsadministration av narkotika](#)

[Leverera handlingar rörande förrådsadministration av narkotika till Regionarkivet](#)

8.6.6 Hantering av avvikelser

Om det upptäcks en avvikelse - att mängden i förbrukningsjournalen inte överensstämmer med den faktiska mängden i läkemedelsförrådet eller om orimliga mängder uthämtats - ska följande göras:

Avvikelse vid kontrollräkning

Sjuksköterskan/farmaceuten som upptäcker avvikelserna ansvarar för att

- kontrollera i aktuell dokumentation om några tabletter/ampuller inte har blivit registrerade på kontrollistan
- prata med kollegor för att hitta en förklaring till avvikelserna
- informera enhetschefen
- skriva en avvikelse i Region Skånes avvikelssystem, kategoriseras som "Säkerhet"

Informationsruta 38

Enhetschefen ansvarar för att tillse att

- avvikelserapport är skriven
- en systematisk genomgång av förbrukningsjournaler och patientjournaler utförs av kontrollansvarig sjuksköterska/farmaceut
- kontroll av signeringar i narkotikajournal görs mot signeringslista
- innehållet i obrutna förpackningar kontrollräknas
- eventuella åtgärder vidtas, till exempel beslut om tätare kontroller av förbrukningsjournaler och eventuellt dubbelsignering under en tid
- medarbetarna informeras om vidtagna åtgärder samt resultatet av åtgärderna.

Informationsruta 39

Vid misstanke om stöld

Enhetschef ska

- omedelbart informera verksamhetschefen
- kontakta HR-specialist
- besluta om vilka åtgärder som ska vidtas t.ex. extra kontrollräkningar, vid behov dagligen
- polisanmäla svinnet/stölden om det inte går att hitta en trovärdig förklaring.

Verksamhetschef ska informera chefläkare. En logg bör upprättas för vilka aktiviteter som vidtagits, vid vilken tidpunkt och av vem.

Informationsruta 40

Vid stöld på bar gärning

- Kontakta enhetschef eller motsvarande, verksamhetschef informeras.
- Verksamhetschef ska
 - informera HR-specialist, för eventuell arbetsrättslig åtgärd i form av avstängning.
 - kontakta säkerhetsansvarig om sådan finns
 - göra polisanmälan på telefon 114 14
 - initiera att en avvikelserapport skrivs
 - ta kontakt med chefläkare.

En logg bör upprättas för vilka aktiviteter som vidtagits, vid vilken tidpunkt och av vem.

Informationsruta 41

9 Hänvisningar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37)

[HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården](#)

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Hälso- och sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardsforordning-201780_sfs-2017-80

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

[Patientsäkerhetslagen - Patientsäkerhet \(socialstyrelsen.se\)](#)

Patientlag (SFS 2014:821)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14)

[Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd \(SOSFS 1997:14\) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård - Patientsäkerhet](#)

Läkemedelsverkets föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning (LVFS 2012:8)

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2012-8>

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

[SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Socialstyrelsen](#)

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2021:75)

[Läkemedelsverkets föreskrifter \(HSLF-FS 2021:75\) om förordnande](#)

[och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; | Läkemedelsverket \(lakemedelsverket.se\)](#)

ANSVAR

Läkemedelsrådets reglemente

<https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/lakemedelsradet/>

KVALITETSGRANSKNING OCH AVVIKELSEHANTERING

Kvalitetsgranskningsmodellen, Region Skåne

[Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering - Region Skånes intranät \(skane.se\)](#)

Information om Avvikelserapportering

[Avvikelserapportering - Ritz](#)

LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR

Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612

Socialstyrelsens föreskrift om in- och utskrivning från slutenvård

[Samverkan vid utskrivning från slutenvård. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten. - Socialstyrelsen](#)

Regionala riktlinjer för utskrivningsinformation

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/utskrivningsinformation/>

Metodstöd basal läkemedelsgenomgång

[Läkemedelsgenomgång - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

Skånemodellen läkemedelsgenomgångar

[Läkemedelsgenomgång - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

Goda läkemedelsråd till våra multisjuka äldre

[God läkemedelsbehandling till äldre - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

Instruktionsfilm för genomförande av läkemedelsavstämning – läkare i slutenvård

[Läkemedelsavstämning - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

UNDERLAG FÖR ORDINATION**Läkemedelsrekommendationer, Skånelistan**

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/skanelistan/>

Avtalade läkemedel, Region Skåne

[Avtalade läkemedel - Vårdgivare Skåne](#)

Sortimentslista patientindividuellt packade doser för slutenvård

[Patientindividuella packade doser \(PiD\) - Region Skånes intranät \(skane.se\)](#)

Utbyteslista, Region Skåne

<https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/>

Läkemedelsrådets övergripande principer för receptförskrivning alternativt egenvård

[Läkemedel - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

Stöd vid läkemedelshantering

[Stöd vid läkemedelshantering – app och webbsida - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/sarskild-landstingssubvention/>

Läkemedel och läkemedelsnära produkter till asylsökande och papperslösa

<https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/lakemedel/>

Dosförpackade läkemedel

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/dosforpackade-lakemedel/>

Information om licensläkemedel, Nationellt produkt- och artikelregister VARA

<https://vara.ehalsomyndigheten.se/vara-web/>

Produktinformation licensläkemedel

<https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/produktinformation-licenslakemedel/>

Licensansökan i KLAS, praktisk hantering

[Licensläkemedel - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

Läkemedelsverkets information om växtbaserade/traditionella växtbaserade/naturläkemedel

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/handel-med-lakemedel/receptfri-handel-utanfor-apotek/receptfria-lakemedel-som-far-saljas/vaxtbaserade-lakemedel-traditionella-vaxtbaserade-lakemedel-naturlakemedel-och-vissa-utvartes-medel>

Läkemedelsboken

<https://lakemedelsboken.se/>

Janusmed interaktioner och riskprofil

<http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Janusmed-interaktioner-och-riskprofil/>

DOKUMENTATION**Melior, samlade dokument**

<https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/melior/>

Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen Melior

[System - Läkemedel-system - Region Skåne \(skane.se\) \(under A. Rutiner\)](#)

PMO, samlade dokument

<https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo>

Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO

[Rutiner och instruktioner - PMO - Vårdgivare Skåne \(skane.se\) \(under Läkemedel - Manualer\)](#)

Sammanhållen journalföring

<https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/journalhantering/sammanhallen-journalforing/>

Beslutsstöd för läkemedelsordinationer till barn

www.ePed.se

FASS

[FASS Vårdpersonal - Startsidea](#)

Vårdhandboken

<http://www.vardhandboken.se/>

Läkemedelsfakta

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsfakta>

Vårdhandboken – Nutrition, enteral – läkemedelstillförsel

[Nutrition, enteral - Vårdhandboken \(vardhandboken.se\)](#)

Läkemedelsverket - Kunskapsstöd enteral**läkemedelsadministrering**

[Enteral läkemedelsadministrering – kunskapsstöd |](#)

[Läkemedelsverket](#)

Användningstider för läkemedel – Svensk läkemedelsstandard (SLS)

[Svensk läkemedelsstandard 2024.1 | Läkemedelsverket](#)

[\(lakemedelsverket.se\)](#)

Biverkningsrapportering

[https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-](https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel#hmainbody1)

[biverkningar/lakemedel#hmainbody1](https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel#hmainbody1)

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel

[https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-](https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2012-14)

[regler/foreskrifter/2012-14](https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2012-14)

Frågor och svar om biverkningar och biverkningsrapportering

[Misstänkt biverkning hos människa | Läkemedelsverket](#)

[\(lakemedelsverket.se\)](#)

Läkemedelsinformationscentral (LÄIF) Region Skåne

[https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsinf](https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsinformationscentral/)
[ormationscentral/](https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsinformationscentral/)

Utökad övervakning

[Läkemedel för människor | Läkemedelsverket \(lakemedelsverket.se\)](#)

Läkemedelsförsäkringen

[Läkemedelsförsäkringen](#)

REKVISITION**Beställa läkemedel**

[Beställ läkemedel - Vårdgivare Skåne](#)

Beställa vaccin

<https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-vaccin/>

Patientindividuellt packade doser, PiD

[Patientindividuella packade doser \(PiD\) - Region Skånes intranät \(skane.se\)](#)

Vägledning Region Skånes läkemedelsförsörjning – Apoteket AB

[Vägledning Region Skånes läkemedelsförsörjning](#)

Information om marknadsplatsen, lathund och informationsfilmer

[Lathundar och instruktionsfilmer för nya Raindance Marknadsplats - Region Skånes intranät](#)

Läkemedelsbeställning via CARE

[Beställ läkemedel - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

Blanketter för beställning

<https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/>

Information om vilka varor som är restnoterade

[Restnoterade läkemedel - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

Licensansökan i KLAS, praktisk hantering

[Licensläkemedel - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

Rutin för mottagningskontroll vid inleverans

[Beställ läkemedel - Vårdgivare Skåne](#)

ANTIDOTER**Giftinformationscentralen**<https://giftinformation.se/>**Sök substans och åtgärd vid förgiftningar**<https://giftinformation.se/lakare#Soksubstans>**KLINISKA PRÖVNINGAR****Forum Söder**<http://sodrasjukvardsregionen.se/kliniskastudier/>**Läkemedel vid klinisk prövning**[Vägledning Region Skånes läkemedelsförsörjning](#)**LÄKEMEDELSFÖRRÅD****ATC-ordning (Anatomiskt, Terapeutiskt, Kemiskt klassificeringssystem)**[ATC-register - FASS](#)**MEDICINSKA GASER****Riktlinjer för hantering av medicinska gaser, Region Skåne**[Gas - beställning - Region Skånes intranät \(skane.se\)](#)**Vårdhandboken, oxygenbehandling**<http://www.vardhandboken.se/Texter/Lakemedelshantering/Medicinska-gaser/>**Hur länge räcker gasflaskan?**<http://www.vardhandboken.se/Texter/Oxygenbehandling/Oxygen-fran-transportabel-oxygenflaska/>**Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anestesigaser, AFS 2001:7**<https://www.av.se>**NARKOTIKA****E-utbildning**[Lärportalen - Säker läkemedelshantering](#)

10 Bilagor

Verksamhetsanpassningar och ansvarsfördelning ska enligt föreskriften förtydligas i lokala instruktioner och för detta ändamål finns regionala stödmallar framtagna. I bilaga 1–18 finns uppdragsbeskrivningar, checklistor och mall till lokala instruktioner. Beroende på verksamhetens uppdrag och behov kan olika stödmallar bli aktuella att använda.

Bilaga 1 Uppdrag ledningsuppgift ansvar för läkemedelshantering

Bilaga 2 Uppdrag och funktionsbeskrivning läkemedelsansvarig läkare

Bilaga 3 Uppdrag och funktionsbeskrivning läkemedelsansvarig sjuksköterska

Bilaga 4 Uppdrag och funktionsbeskrivning kontrollansvarig sjuksköterska/farmaceut

Bilaga 4a Checklista för kontroll och inventering av narkotika

Bilaga 5 Uppdrag och funktionsbeskrivning gasansvarig

Bilaga 5a Förvaring och kontroll av medicinsk gasflaska på enhet

Bilaga 6 Uppdrag rekvirering av läkemedel

Bilaga 7 Uppdrag att dosjustera ett ordinerat läkemedel

Bilaga 7a Dosjustering läkemedel eller läkemedelsgrupp

Bilaga 8 Blankett generella direktiv Melior

Bilaga 9 Blankett generella direktiv primärvård

Bilaga 10 Blankett för delegeringsbeslut

Bilaga 11 Anvisningar och protokoll för skötsel av läkemedelsförråd

Bilaga 12 Blankett för namnteckning och signatur

Bilaga 13 Blankett för temperaturkontroll

Bilaga 14 Blankett vid lån av narkotikaklassade läkemedel

Bilaga 15 Lokal instruktion för läkemedelshantering slutenvård och specialistvård

Bilaga 16 Lokal instruktion för läkemedelshantering primärvård

Bilaga 17 Uppdrag förskriva naloxon

Bilaga 18 Journal för kassation av narkotika i dospåsar