

Diabetesläkemedel

NNT (Numbers needed to treat) för det primära effektmåttet

Studie	Läkemedel	NNT/ studieduration
Diabetes och hjärt- och kärlsjukdom*		
SGLT2-hämmare		
EMPA-REG	empagliflozin vs placebo	63/3,1 år
DECLARE- TIMI 58	dapagliflozin vs placebo	ej visat
CANVAS	kanagliflozin vs placebo	46/3,5 år
GLP1-analoger		
LEADER	liraglutid vs placebo	53/3,8 år
SUSTAIN-6	semaglutid sc. vs placebo	45/2 år
PIONEER 6	semaglutid p.o. vs placebo	ej visat
REWIND	dulaglutid vs placebo	71/5,4 år
SOUL	semaglutid p.o. vs placebo	56/4,1 år
Hjärtsvikt **		
DAPA-HF	dapagliflozin vs placebo	21/1,5 år
EMPEROR-Reduced	empagliflozin vs placebo	19/1,3 år
EMPEROR-Preserved	empagliflozin vs placebo	31/2,2 år
DELIVER	dapagliflozin vs placebo	32/2,3 år
Diabetesnefropati/nedsatt njurfunktion ***		
CREDENCE	kanagliflozin vs placebo	22/2,6 år
DAPA-CKD	dapagliflozin vs placebo	19/2,4 år
EMPA-kidney	empagliflozin vs placebo	26/2 år
FLOW	semaglutid sc. vs placebo	26/3,4 år

Primärt effektmått:

- * hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död
- ** sjukhusvård för hjärtsvikt och kardiovaskulär död
- *** nedsättning av njurfunktion, terminal njursjukdom och kardiovaskulär/renal död