



# Koncernkontoret

## Läkemedelsrådet

### REGIONAL LÄKEMEDELSRIKTLINJE

Process	3.3.9	Godkänt datum	2021-05-21
Skapad av	LAG läkemedel hjärt- och kärlsjukdomar	Version	3
Godkänd av	Läkemedelsrådet		
Gäller för	Utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne	Gäller fr.o.m.	2025-10-14
		Gäller t.o.m.	2027-10-14

## Intramuskulär injektion/vaccination i deltoidmuskeln hos patienter som behandlas med antikoagulantia och/eller trombocythämmare

Patienter som står på NOAK (dabigatran, Eliquis, Lixiana, Xarelto), lågmolekylärt heparin

(Fragmin, Innohep, Klexane) eller Waran (senaste PK INR < 3) kan alla erhålla intramuskulär injektion/vaccination i deltoidmuskeln. Detsamma gäller patienter som står på enkel eller dubbel trombocythämmare.

Vid samtidig antikoagulantia och trombocythämmande behandling bör behandlande läkare göra en individuell bedömning.

Viktigt att man komprimerar i minst 5 minuter över insticksstället efter injektionen.

### 1 Följande Förändringar jämfört med tidigare version

2025-10-14

Avsnitt	Uppdatering
	Pradaxa ändrat till generiskt dabigatran. Läkemedelsriktlinjen är förlängd

Intramuskulär injektion/vaccination i deltoidmuskeln hos patienter som behandlas med antikoagulantia och/eller trombocythämmare

Läkemedelsrådet i Region Skåne

Originalen finns elektroniskt. Vid utskrift ansvarar användaren att gällande version används