



Koncernkontoret

Läkemedelsrådet

REGIONAL LÄKEMEDELSRIKTLINJE

Process	3.3.9	Gäller fr.o.m.	2026-03-02
Skapad av	LAG läkemedel	Gäller t.o.m.	2028-03-02
Godkänd av	Läkemedelsrådet		
Gäller för	Utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne	Version	1
		Dokument id	L5BK4-01

Patientinformation om dabigatran

1 Vad är dabigatran?

Dabigatran är ett blodförtunnande läkemedel som minskar risken för stroke på grund av blodpropp i hjärnan vid förmaksflimmer.

Läkemedlet gör att blodet inte leverar sig lika lätt.

2 Hur tar jag dabigatran?

- Svälj kapseln hel med lite vatten.
- Kan tas med eller utan mat.
- Ta läkemedlet vid samma tider varje dag, en gång på morgonen och en gång på kvällen.
- Följ alltid den dos som din läkare har ordinerat.

Viktigt:

Kapslarna får inte tuggas, krossas eller öppnas. Kapslarna är känsliga för fukt (förutom från vissa enskilda tillverkare). Ta dem inte ur originalförpackningen i förväg (till exempel till dosett), om du inte fått andra instruktioner.

3 Om du glömmer en dos

- Ta dosen så snart du kommer ihåg (om det är mer än 6 timmar tills du ska ta nästa dos).
- Är det nära nästa dos (mindre än 6 timmar) – hoppa över den missade dosen och invänta nästa dos och ta den som vanligt.
- Ta aldrig dubbel dos.

4 Blödning – viktigt att vara uppmärksam på

Eftersom dabigatran är blodförtunnande finns en ökad risk för blödningar, till exempel blåmärken, näsblod eller från mage/tarm.

Kontakta vården om du får:

- ovanligt stora blåmärken.
- långvarigt näsblod.
- blod i urin eller avföring.
- blödning som inte slutar av sig själv.
- kraftig trötthet, yrsel eller plötslig huvudvärk.

Sök akut vård vid kraftig eller okontrollerad blödning.

5 Inför operation eller tandbehandling

Berätta alltid för läkare, tandläkare eller annan vårdpersonal att du tar dabigatran.

Läkemedlet kan behöva pausas inför vissa ingrepp.

6 Andra läkemedel

Vissa läkemedel kan öka risken för blödning.

- Tala om för vården vilka läkemedel och kosttillskott du använder.
- Undvik antiinflammatoriska läkemedel (ibuprofen, naproxen, diklofenak med flera) och läkemedel innehållande acetylsalicylsyra (till exempel treo) utan att rådfråga vården eftersom de kan öka risken för blödning.
- Paracetamol (t.ex. Alvedon) går bra att använda tillsammans med dabigatran.

7 Uppföljning

Din njurfunktion kontrolleras regelbundet, eftersom njurarna påverkar hur läkemedlet bryts ner i kroppen.

8 Avsluta inte behandlingen själv

Sluta inte ta dabigatran utan att först tala med läkare.

Att avsluta behandlingen plötsligt ökar risken för stroke.

Du kan läsa mer information på 1177.se eller www.fass.se. Har du frågor om din medicin, fråga din läkare.