

Vägledning, utifrån vårdnivå, vid val av symtomlindrande läkemedelsbehandling vid FMT hos barn och ungdomar

Huvudsakligt symtom	Läkemedelsbehandling som kan initieras och utvärderas av: Primärvård	Läkemedelsbehandling som kan initieras och utvärderas av: Specialistvård (ofta efter samråd med gastroenterolog)
Illamående, dyspepsi	<i>Lindrig:</i> Syrabindare vid behov <i>Svår:</i> Protonpumpshämmare 4 veckor	Steg 1: <i>Lindrig:</i> Syrabindare vid behov <i>Svår:</i> Protonpumpshämmare 4 veckor Steg 2: Långvarig protonpumpshämning Ondansetron
Förstoppning	Råd om lösliga kostfibrer Långvarig osmotiskt laxativ Bulkmedel/sterkuliagummi Kortvarigt tarmirriterande laxativ >12 års ålder Enstaka dos rektal laxantia	Steg 1: Råd om lösliga kostfibrer Långvarig osmotiskt laxativ Bulkmedel/sterkuliagummi Kortvarigt tarmirriterande laxativ Kortvarigt rektal laxantia Steg 2: Långvarigt tarmirriterande laxativ Långvarig lavemangsbehandling Prukaloprid
Diarré	Råd om lösliga kostfibrer Bulkmedel/sterkuliagummi Kortvarig loperamidbehandling >12 års ålder	Steg 1: Råd om lösliga kostfibrer Bulkmedel/sterkuliagummi Kortvarig loperamidbehandling Steg 2: Långvarig loperamidbehandling Ondansetron Gallsaltsbindare
Uppblåsthetskänsla	Förstoppningsbehandling bör övervägas	Steg 1: Förstoppningsbehandling bör övervägas Pepparmyntsolja >8 års ålder Steg 2: Prukaloprid
Buksmärta på grund av tarmdysmotilitet eller hypersensitivitet		Steg 1: Pepparmyntsolja >8 års ålder Steg 2: Prukaloprid Centrala nervmodulerare
Svårbehandlade symtom med psykologisk eller annan funktionell samsjuklighet		Steg 1: Psykosociala interventioner Steg 2: Centrala nervmodulerare