

# BoF - Premedicinering vid känd kontrastmedelsöverkänslighet barn

## *ELEKTIV undersökning*

### 12 timmar samt 2 timmar före undersökningen:

Tabl. Prednisolon ( $\geq 6$  år 50 mg;  $< 6$  år 30 mg)

eller

Tabl. Betapred 0,5 mg ( $\geq 6$  år 5 mg;  $< 6$  år 3 mg)

samt

$\geq 12$  år Tabl. Caredin 10 mg, (eller annat icke sederande antihistamin i dubbel dos)

6-12 år Tabl Caredin 5 mg eller Oral lösning Desloratadine 0,5 mg/ml 10 ml (= 5 mg)

$< 6$  år Oral lösning Desloratadine 0,5 mg/ml 5 ml (= 2,5 mg)

**Patienten ska ha fått sina tabletter hos remittenten och vara färdig- medicinerad när han/hon kommer. Annars skickas patienten hem och får ny tid.**

## *AKUT undersökning*

### omedelbart och sedan var 4:e timme fram till undersökningen

Solu-Cortef i.v. ( $\geq 6$  år 250 mg;  $< 6$  år 100 mg)

eller

Betapred i.v. ( $\geq 6$  år 8 mg;  $< 6$  år 4 mg) samt

### 1 timme före undersökningen:

$\geq 12$  år Tabl. Caredin 10 mg, (eller annat icke sederande antihistamin i dubbel dos)

6-12 år 6-12 år Tabl Caredin 5 mg eller Oral lösning Desloratadine 0,5 mg/ml 10 ml (= 5 mg)

$< 6$  år Oral lösning Desloratadine 0,5 mg/ml 5 ml (= 2,5 mg)

**Premedicinering ska ske på remitterande avd.**