

Rubrik  
**Bild - Debiri - PM för GUT**

Dokumenttyp  
**Riktlinje**

Gäller from 2020-06-02 Giltigt t o m 2023-06-01

Sida:

Författare  
**Brinck Anita**

Faktaägare  
**Baubeta Fridh Erik**

1 (2)

Gäller för (enhet)  
**VE bild och funktion, SUS**

*Utskrivet dokument gäller inte som original!*

Version:  
1

## Debiri – PM (för enhet gastro/uro/thoraxradiologi)

Arteriell embolisering med cytostatikabehandling

Utförs för att öka överlevnaden vid inoperabel levermalignitet (primärtumör eller metastaser). Den minskar tumörbördan och det hormonella påflödet. Ibland ges lokal cytostatikabehandling i samband med emboliseringen. Punktion görs via artärsystemet efter lokalanestesi och ev sedering.

### Indikation

Behandling enligt remiss och i överenskommelse med ansvarig interventionell radiolog. Remiss till Röntgen Lund.

### Provtagning

Blodgrupp, bastest, Hb, vita, tromb, PK, APTT, Na, K, Krea, Bil, Alp, ALAT, ASAT.

### Premedicinering och preoperativ infektionsprofylax

**TACE - DEBIRI – farmaka före, under och efter proceduren (appendix till kirurgens gällande PM avseende TACE**

#### 1 timme före proceduren:

T Betapred 0,5 mg, 16 tabl p.o (löses i vatten)

T Bactrim Forte 800 mg/160 mg, 2 tabl

T Flagyl 400 mg, 2 tabl

T Ondansetrone 4 mg, 1 tabl

T Oxycontin 10 mg, 1 tabl

T Paracetamol 500 mg 2 st

Ringeracetat 1000 ml

Inj Ketogan 5 mg/ml, 0,5-1 ml i.v. v b

### Kontraindikationer

Se Angiografi - PM.

## **Medicinering**

Se Angiografi - PM.

## **Kontrastmedelsöverkänslighet**

Se Angiografi - PM.

## **Vätskebehandling**

Se Angiografi - PM.

## **Omvårdnad**

Före:

Patienten ska vara fastande 4 timmar.

Patienten ska ha KAD.

Vid arteriell embolisering ska patienten premedicineras med 4 mg Betapred i v på morgonen före undersökningen.

Under proceduren:

Ca 5 min före inj av cytostatika ges inj Ondansetron 2 mg/ml 2 ml (4 mg) långsamt i v mot illamående.

Inj Carbocain 10 mg/ml, 2-5 ml intraarteriellt via kateter innan DEBIRI injektion.

Embolisering med DC Beads M1 70-150 µm laddade med 100 mg Irinotecan. Blandas med Visipaque 270 mg/ml.

Efter proceduren:

Inj Ketogan 5 mg/ml, 1 ml s c efter ca 3 timmar  
T Oxynorm 5 mg, 1 tabl v b

**Om kraftig blodtrycksstegring tillstöter kontakta i första hand patientansvarig läkare eller anesthesi.**