

Rubrik
**Bild - Suprapubisk blåsfistel
- PM för GUT**

Dokumenttyp
Riktlinje

Gäller from 2020-06-02 Giltigt t o m 2023-06-01

Sida:

Författare
Brinck Anita

Faktaägare
Baubeta Fridh Erik

1 (2)

Gäller för (enhet)
VE bild och funktion, SUS

Utskrivet dokument gäller inte som original!

Version:
1

Suprapubisk blåsfistel – vuxen patient (PM för gastro/uro/thoraxradiologi)

Utförs primärt via urologkliniken i Malmö

Rutiner om ingreppet utförs i Lund:

Kontraindikationer att beakta

- *Uttalad blödningsbenägenhet* eller antikoagulantibehandling se [Antikoagulantiarutiner inför interventionella ingrepp vid BoF](#).
- *Kontrastmedelsöverkänslighet*, se [Premedicinering vid känd kontrastmedelsöverkänslighet](#), vuxna BOF eller [Premedicinering vid känd kontrastmedelsöverkänslighet](#), barn BOF.
- *Njurfunktionsnedsättning* och/eller pågående medicinering med *Metformin* se [Röntgen- och MR-undersökningar med intravaskulära kontrastmedel](#) - för remittenter.
- *Graviditet* (relativ kontraindikation)

Förberedelser

- Patienten ska vara fastande 4 timmar innan ingreppet.
- Patienten ska vara försedd med PVK.
- Pat ska ha KAD.
- Provtagning – se nedan.
- Premedicinering ordinerar av patientansvarig läkare
- **Om patienten inte är inneliggande på Skånes universitetssjukhus i Lund ska remittenten ombesörja att vårdplats finns på någon avdelning i Lund inför ingreppet och för eftervården.**

Provtagning

Före intervention: Trombocyter, APT-tid, PK och kreatinin. Svar ska finnas tillgängliga när patienten kommer till ingreppet.

Medicinering

Stående medicinering: Ges enligt tidigare ordination.

Omvårdnad

Före: Klädsel: patientkläder. Patienten ska vara nydusbad.

Med till röntgen: Eventuell överkänslighet och eventuell uppgift om beslut om begränsningar gällande HLR och IVA ska anges. Patienten transporteras i säng.

Uppdukning

Pecutanset

Ultraljudsset

Ev Chibanål

Ev dilatatorer 8-9-10-12-14 F

T ex Suprapubisk kateterset 12 (eller 14Ch) – fås från urologmottagningen

Glyco-Block tas upp på ordination av läkare.

För NaCl-injektion i urinblåsan värms 500 ml NaCl till rumstemperatur och blandas med 50 ml Visipaque 270 mg/ml. Denna blandning injiceras i KAD via sugslang med nippel när läkare säger till.

Kontrastmedel Visipaque 270 mg/ml

Utförande

Med hjälp av ultraljud (eller genomlysning) punkteras urinblåsan antingen med Chibanål eller finnål eller i vissa fall direkt med nålen som tillhör katetersetet.

För att underlätta punktionen fylls blåsan på med kroppstempererad NaCl-blandning (50 ml Visipaque 270 mg/ml + 500 ml NaCl) via befintlig KAD.

Under genomlysning insprutas kontrast och ledare förs in i blåsan.

Kanalen dilateras och en suprapubisk kateter förs in. Ballongen blåses upp med GlycoBlock. Mängden Glyco-Block noteras i journalen.

Eftervård

Katetern fixeras och kopplas mot Uribag. Patienten överförs till vårdavdelning. Sängläge 4 timmar.

Katetern spolras enligt ordination från radiolog.

Om katetern dras ut accidentiellt, ska Angioröntgen på Akutröntgen/Gastro-urothoraxröntgen kontaktas omgående, för att underlätta ny kateterinsättning.