

# **BoF - Premedicinering vid känd kontrastmedelsöverkänslighet barn**

## ***ELEKTIV undersökning***

### **12 timmar samt 2 timmar före undersökningen:**

Tabl. Prednisolon ( $\geq 6$  år 50 mg;  $< 6$  år 30 mg)

**eller**

Tabl. Betapred 0,5 mg ( $\geq 6$  år 5 mg;  $< 6$  år 3 mg)

**samt**

$\geq 12$  år Tabl. Caredin 10 mg (eller annat icke sederande antihistamin i dubbel dos)

6-12 år Tabl Caredin 5 mg **eller** Oral lösn Desloratadine 0,5 mg/ml 10 ml (= 5 mg)

$< 6$  år Oral lösn Desloratadine 0,5 mg/ml 5 ml (= 2,5 mg)

**Patienten ska ha fått sina tabletter hos remittenten och vara färdigmedicinerad när han/hon kommer. Annars skickas patienten hem och får ny tid.**

## ***AKUT undersökning***

### **Omedelbart och upprepas sedan var 4:e timme fram till undersökningen:**

Solu-Cortef i.v. ges långsamt ( $\geq 6$  år 200 mg;  $< 6$  år 100 mg)

**eller**

Betapred i.v. ges långsamt ( $\geq 6$  år 8 mg;  $< 6$  år 4 mg)

**samt**

### **1 timme före undersökningen:**

$\geq 12$  år Tabl. Caredin 10 mg (eller annat icke sederande antihistamin i dubbel dos)

6-12 år Tabl Caredin 5 mg **eller** Oral lösn Desloratadine 0,5 mg/ml 10 ml (= 5 mg)

$< 6$  år Oral lösn Desloratadine 0,5 mg/ml 5 ml (= 2,5 mg)

**Premedicinering ska ske på remitterande avd.**