

Rubrik
Kontrastmedelsöverkänslighet, förbehandling

Dokumenttyp
Riktlinje

Faktaägare

Gäller from
2020-01-09

Giltigt t o m
2026-02-18

Sida:

1 (3)

Författare
Navntoft Anders

Gäller för (enhet)
**Röntgen Ängelholm;
Röntgen Helsingborg;
Röntgen Landskrona**

Utskrivet dokument gäller inte som original!

Version:
15

Förbehandling vid kontrastmedelsöverkänslighet

1. Överväg indikationen. Diskutera alternativa undersökningsmetoder med inremitterande.
2. Tidigare kontrastmedelsreaktioner. Överväg byte av intravenöst kontrastmedel.

Lindrig reaktion

Icke behandlingskrävande. Lätt klåda, hudrodnad. Ingen premedicinering.

Måttlig reaktion

Behandlingskrävande men utan intensivvård.

Premedicinering enligt nedan:

- **Hud:** Klåda, flush (tydlig hudrodnad), lokal urtikaria (upphöjda nässelutslag), angioödem (svullnad i ansikte, läppar, ögonlock och ibland tunga – men inte andnöd).
- **Ögon och näsa:** Konjunktivit med klåda och rodnad. Rhinit med snuva, nästäppa, klåda och nysningar.
- **Mun och mag/tarm:** Munklåda, läppsvullnad (angioödem). Svullnadskänsla i mun och svalg. Illamående, lindrig buksmärta och i enstaka fall kräkningar.

Svår reaktion

Intensivvårdskrävande cirkulations-/andningspåverkan. Om indikationen är synnerligen stark och annan modalitet inte anses svara på frågeställningen.

Premedicinering enligt nedan:

- Narkosberedskap alternativt genomföra undersökningen i narkos.

Premedicinering, vuxna och barn över 12 år

ELEKTIV UNDERSÖKNING

1. 12 timmar innan undersökningen: Tablett Betapred® 8 mg (16 stycken á 0,5 mg upplösta i vatten) + Tablett Caredin® munlöslig, 10 mg.
2. 2 timmar innan undersökningen: Tablett Betapred® 8 mg (16 stycken á 0,5 mg upplösta i vatten) + Tablett Caredin® munlöslig, 10 mg.

AKUT UNDERSÖKNING

1. Injektion Betapred® 4 mg/ml, 2 ml iv 30 minuter innan undersökningen.
2. Tablett Caredin® munlöslig, 10 mg.
3. Akutvagnen vid undersökningsrummet.
4. Narkosberedskap.

Premedicinering, barn 0-11 år

ELEKTIV UNDERSÖKNING

1. 12 timmar innan undersökningen:
Barn 6-11 år: Tablett Caredin® 5 mg, Tablett Betapred® 0,5 mg 12 stycken (6 mg) upplösta i vatten.
Barn <6 år: Tablett Caredin® 2,5 mg, Tablett Betapred® 0,5 mg 8 stycken (4 mg) upplösta i vatten.
2. 2 timmar innan undersökningen:
Barn 6-11 år: Tablett Caredin® munlöslig 5 mg, Tablett Betapred® 0,5 mg 12 stycken (6 mg) upplösta i vatten.
Barn <6 år: Tablett Caredin® munlöslig 2,5 mg, Tablett Betapred® 0,5 mg 8 stycken (4 mg) upplösta i vatten.

AKUT UNDERSÖKNING

1. 30 minuter innan undersökningen:
Barn 6-11 år: Injektion Betapred® 4 mg/ml, 2 ml iv.
Tablett Caredin® munlöslig, 5 mg
Barn <6 år: Injektion Betapred® 4 mg/ml, 1 ml iv.
Tablett Caredin® munlöslig 2,5 mg.
2. Akutvagnen vid undersökningsrummet.
3. Narkosberedskap.

Behåll den intravenösa infarten och övervaka patienten i 60 minuter.

Anders Engevall
Leg. läkare