

*Utskrivet dokument gäller inte som original!*

# **BoF - Premedicinering vid känd kontrastmedelsöverkänslighet vuxna patienter**

## ***ELEKTIV undersökning***

### **12 timmar** samt **2 timmar** före undersökningen:

Tabl. Prednisolon 5 mg x 10 st

Tabl. Cetirizin 10 mg x 1 st

**Patienten ska ha fått sina tabletter hos remittenten och vara färdigmedicinerad när han/hon kommer. Annars skickas patienten hem och får ny tid.**

---

## ***AKUT undersökning som kan vänta 1 timme***

### **1 timme** före undersökningen:

Tabl. Cetirizin 10 mg x 1 st

### **Precis innan patienten skickas till röntgen:**

Inj. Solu-Cortef 200 mg i.v.

**Premedicinering sker på remitterande avd.**

**INTE hos oss!!**

---

## ***URAKUT undersökning***

***Premedicinering görs på VO Bild och funktion, efter läkarordination, av patientansvarig röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker***

### **Omedelbart:**

Inj Solu-Cortef 200 mg i.v.

### **3 minuter** före kontrastmedelsinjektion:

Munsönderfallande tabl Caredin 5 mg x 1