


Behandlingstrappa för barn 0–5 år



Förkortningar: SABA – kortverkande bronkvidgare. LABA – långverkande bronkvidgare. ICS – inhalationssteroid. LTRA – leukotrienantagonist.

Noter till behandlingstrappan

Steg 1

- Vid lindriga besvär kan SABA ges vid luftvägsinfektion.
- Vid svårare besvär i samband med luftvägsinfektion rekommenderas
 - Flutikason 125 µg 1 x 4 i 3–4 dagar, sedan 1 x 2 i 7 dagar

Steg 1 + 2

- Allergisk läggning stärker indikationen för kontinuerlig behandling med ICS.

Steg 3 + 4 – Välj LABA salmeterol som är godkänd från 4 år (formoterol är endast godkänd från 6 år). Överväg remiss till specialiserad vård.

Behandlingstrappa för barn 6–11 år

Underhållsbehandling			
Vid behovs-behandling			
Behandlingsindikation			
Steg 1		Steg 2	
		Någon av följande: <ul style="list-style-type: none"> • ICS lågdos (alt direkt till steg 3) • LTRA i andra hand 	
		Steg 3	
		Någon av följande: <ul style="list-style-type: none"> • ICS + LABA • ICS medelhög dos • Överväg tillägg med LTRA • Överväg remiss 	
		Steg 4	
		<ul style="list-style-type: none"> • ICS medelhög till högdos + LABA + LAMA + LTRA • Remiss 	
ICS+FABA vid behov		ICS+FABA eller SABA vid behov	
Symtom 0–1 gång per månad	Astmabesvär > 1 gång per månad eller svåra anfall	Bristande kontroll trots behandling i steg 2	Bristande kontroll trots behandling i steg 3

Förkortningar: SABA – kortverkande bronkvidgare. LABA – långverkande bronkvidgare. FABA – snabbverkande bronkvidgare (SABA eller LABAn formeterol). ICS – inhalationssteroid. LTRA – leukotrienantagonist. LAMA – långverkande antikolinergika

<p>Noter till behandlingstrappan</p> <p>Steg 1 – 4 – ICS+FABA som fast kombination i lägsta dos ska användas (finns bara med formeterol).</p> <p>Steg 2 – ICS har bättre effekt än LTRA, framför allt hos barn med allergisk läggning.</p> <p>Steg 2 + 3 – Om ICS+FABA används vid behov i steg 2 kan ett av följande alternativ väljas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ge ICS som underhållsbehandling i annan inhalator. • Gå direkt till steg 3 och använd ICS+FABA i lågdos även som underhållsbehandling. Upp till 8 doser per dygn kan användas under kortare perioder. <p>Steg 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Överväg tillägg av LTRA till ICS vid otillräcklig effekt av ICS + LABA. • Vid dosökning till ICS medelhög dos måste ICS+FABA vid behov fortsatt vara lågdos. • Överväg remiss till specialiserad vård. <p>Steg 4 – Remiss till specialiserad vård.</p>
--