

Symtom och fynd vid lymfom hos barn

Många symtom som kan förekomma vid cancer förekommer också vid benigna och betydligt vanligare tillstånd. Framför allt vid återkommande symtom, persisterande symtom eller en kombination av flera av nedan nämnda symtom bör cancer hos barn övervägas.

Symtom och fynd som kan förekomma vid lymfom

- Förstorade lymfkörtlar (≥ 2 cm som inte minskar i storlek inom 3–4 veckor), särskilt om de:
 - bildar konglomerat
 - är hårda och runda
 - tillväxer utan samtidig infektion.
- B-symtom (feber, viktnedgång, nattliga svettningar).
- Förstorad mjälte eller lever.
- Flera av symtomen för solida tumörer (se nedan) kan även förekomma vid lymfom beroende på lokalisation, exempelvis akut buk, andningspåverkan och halsvenstas.
- Blodstatus påverkad i mer än en cellinje (Hb, leukocyter eller trombocyter) eller förekomst av blaster i differentialräkning.

Symtom och fynd som kan förekomma vid solida tumörer

- Nyttillkommen eller tillväxande resistens.
- Smärta, hälta (framför allt ensidig).
- Trötthet.
- Patologisk fraktur.
- Urinretention, nyttillkommen enures eller förstoppning som ej svarar som förväntat på sedvanlig behandling alternativt vid avvikande fynd vid pr-undersökning.
- Neurologiska symtom (t.ex. Horners syndrom eller ryggmärgspåverkan).
- Feber, svettningar.
- Andningspåverkan.
- Halsvensstas.
- Akut buk.
- Hematuri.
- Vit ögonbottenreflex eller synpåverkan.

Allmänna symtom som kan förekomma vid cancer hos barn

- Feber som inte går över.
- Failure to thrive eller oavsiktlig viktnedgång.
- Oförklarlig trötthet och sjukdomskänsla.
- Smärta, särskilt nattlig skelettsmärta eller ryggsmärtor hos små barn.
- Förstoppning som inte svarar på behandling.
- Sjukt barn utan känd orsak.
- För tidig eller försenad pubertet och andra endokrinologiska rubbningar.

Tillstånd med ökad risk att utveckla cancer i barndomen

De flesta cancerformer hos barn är inte ärftliga, men följande tillstånd har en ökad cancerrisk:

- Downs syndrom.
- Neurokutana syndrom som neurofibromatos.
- Immunbristsjukdomar.
- Hemihypertrofi.
- Barn som tidigare behandlats för cancer.
- Ärftliga barncancersyndrom.

Om cancer hos barn

Varje år drabbas cirka 350 barn i Sverige av cancer, där ungefär 1/3 är leukemi, 1/3 hjärntumör och 1/3 solid tumör. Förskoleåldern är den vanligaste debutåldern, men olika diagnoser är vanliga i olika åldrar. Överlevnaden i barncancer är cirka 85 procent.

De flesta barncancerformer är högmaligna och snabbväxande varför barnklinik och/eller barncancercentrum bör kontaktas skyndsamt vid stark misstanke.