


# Regional riktlinje för byte av perifer venkateter (PVK) vid klinisk indikation

---

Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektören.



## **Förord**

Denna riktlinje är ett komplement till den nationella Vårdhandbokens avsnitt Perifer venkateter och är ett förtydligande av rutiner för bytesfrekvens och dokumentation av PVK.

## Dokumentinformation

	Namn	Position	E-postadress
<b>Faktaansvarig</b>	Ann Svensson	Chefsjuksköterska, Skånevård Sund	<a href="mailto:Ann.Svensson@skane.se">Ann.Svensson@skane.se</a>
<b>Fastställt av</b>	Koncernrådet för patientsäkerhet, Koncernkontoret		
<b>Sakkunniggrupp</b>	Regionala Vårdhandboksrådet		<a href="mailto:vardhandboksradet@skane.se">vardhandboksradet@skane.se</a>
<b>Sakkunniggrupp</b>	Anna Jerkeman	Ordförande, Expertgrupp smittsamma sjukdomar	<a href="mailto:Anna.jerkeman@skane.se">Anna.jerkeman@skane.se</a>
<b>Kontaktperson Koncernkontoret</b>	Anneli Juhlin	Regional patientsäkerhetssamordnare	<a href="mailto:Anneli.Juhlin@skane.se">Anneli.Juhlin@skane.se</a>
<b>Administrativ kontaktperson</b>			

## Giltighet

	Giltigt från och med	Giltigt till och med	Ansvarig/huvudförfattare
<b>Ursprunglig version</b>	2016-09-23	2020-03-01	Ann Svensson
<b>Revidering</b>	2018-03-01	2020-03-01	Agnetha Perlkvist
<b>Revidering</b>			
<b>Revidering</b>			
<b>Revidering</b>			

## Sökord


## Bytesfrekvens

I Region Skåne gäller bytesfrekvens utifrån klinisk indikation, vilket förutsätter att det finns välfungerande rutiner på varje enhet, för de regelbundna inspektionerna av PVK.

Behovet av PVK ska kontinuerligt omprövas och insticksstället ska kontrolleras 3–4 gånger per dygn, förslagsvis i början av varje arbetspass (men med hänsyn till patientens sammanhängande vila).

En PVK ska ligga inne i blodbanan kortast möjliga tid, vilket innebär att den tas bort då behov av venös infart inte längre finns.

Vid minsta tecken på komplikation är huvudregeln att PVK:n ska avlägsnas. Patientansvarig läkare ska alltid informeras vid misstanke om PVK-relaterad infektion.

## Dokumentation

I journalanteckningen Perifer venkateter dokumenteras tidpunkt för in- och utsättning, PVK-lokalisation och storlek, typ av komplikation samt tidpunkt för senaste inspektion.

*Observera att en komplikation alltid ska dokumenteras i patientjournalen.*

## Rapportering i avvikelssystemet

Vid uppkommen vårdskada eller allvarlig komplikation relaterad till PVK ska en avvikelserapport skrivas.