

## Anvisningar till chefer för ställningstagande till provtagning av vård- och omsorgspersonal vid misstanke om covid-19

### Indikationer för provtagning

Det är närmsta chef som avgör ifall provtagning ska göras och som skickar en beställning till den lokala provtagningsenheten. Provtagning ska göras på vårdpersonal som har insjuknat nyligen med feber och/eller luftvägssymtom. Provtagning ska ske tidigt i sjukdomsförloppet (inom 72 timmar från symtomdebut).

Provtagning rekommenderas också om vård- och omsorgspersonal är hushållskontakt med någon med bekräftad covid-19 infektion. Provtagning görs då 5 dagar efter det att den covid-19 positiva i hushållet provtog sig. Hushållskontakten skall vara hemma i väntan på provsvar.

Provtagning ska inte användas efter genomgången sjukdom för att konstatera smittfrihet. Oro för covid-19 utgör ensamt inte någon indikation för provtagning.

### Provsvär

Medarbetaren informeras om provresultatet och rekommenderas att kontakta närmsta chef och meddela provresultatet. Vid positivt provsvar kontaktas medarbetaren av läkare och får förhållningsregler. Negativa provsvar registreras i journalen och den provtagna medarbetaren kan få tillgång till svaret genom att logga in på 1177 Vårdguiden och läsa i journalen. Vid negativt provsvar kan medarbetaren återgå i arbete så snart hen känner sig frisk och orkar arbeta igen.