

کلامیدیا، قابل توجه بیماران

اطلاعات و دستورالعمل ها برای بیماران. برگه اطلاعاتی پزشک متخصص بیماری های واگیردار

شما به بیماری کلامیدیا دچار شده اید (و یا گمان می رود که دچار شده باشید). بیماری عفونی کلامیدیا ناشی از یک نوع باکتری است که از راه همخوابگی به دیگران سرایت می نماید. این نوع باکتری در مجاری ادرار و یا در مهبل (واژن) زنان وجود دارد. بیشتر مبتلایان هیچ نشانه ای از عفونت کلامیدیا ندارند و نمی دانند که دچار این بیماری واگیردار شده اند.

زنان ممکن است دچار آسیب لوله زهدان شوند و در این صورت این خطر وجود دارد که این عوارض منتهی به بارداری خارج از رحم و یا نازائی شود. مردان ممکن است دچار عفونت "اپیدیدیمیس" یا قسمت پشت بیضه ها شوند. این عوارض عفونی با داروهای آنتی بیوتیک درمان می شوند.

از آنجا که بسیاری از مردم نمی دانند که دچار کلامیدیا هستند، لذا مهم است که افرادی که شما با آنها همخوابگی داشته اید و ممکن است بیماری از آنها به شما سرایت کرده باشد، - و یا بیماری از شما به آنها سرایت کرده باشد - به پزشک مراجعه نمایند و معاینه شوند، به اصطلاح ردیابی بیماری واگیردار.

برای پیشگیری از شیوع بیماری واگیردار بایستی دستورالعمل های زیر را رعایت نمائید:

- * بایستی داروهائی را که پزشکتان برای شما تجویز نموده، استفاده نمائید.
 - * شما بایستی پیش از استفاده از تمامی داروهای آنتی بیوتیک تان و زودتر از 10 روز پس از آغاز درمان، همخوابگی و یا دیگر فعالیت های جنسی (مانند نوازش های جنسی) که می تواند موجب سرایت بیماری شود داشته باشید.
 - * اگر پزشک شما بخواهد که شما وقت تازه ای نزد وی بگیریید تا کنترل کند که آیا عفونت شما بهبود یافته است یا نه، بایستی نزد وی بروید.
 - * در صورتی که جواب آزمایش کلامیدیا مثبت باشد، باید در امر ردیابی آن بیماری واگیردار همکاری نمائید.
- بر اساس قانون پیشگیری از شیوع بیماری واگیردار (Smittskyddslagen) شما موظف هستید دستوراتی را که دریافت نموده اید، رعایت کنید. اگر بخواهید این دستورات را تغییر دهید، بایستی با پزشک متخصص بیماری های واگیردار (Smittskyddsläkare) در استان محل سکونت خود تماس بگیریید و درخواست نمائید که در آن دستورات تجدید نظر شود.