



Smittskydd Skåne

Giltig från och med 2026-01-22

Godkänd av Smittskyddsläkaren

Version 1.0

Mjältbrand – Smittskyddsblad patientinformation

Varför har jag fått den här informationen?

Prov har visat att du har mjältbrand eller du har provtagits på misstanke om mjältbrand.

Vad är mjältbrand?

Mjältbrand (även kallad antrax) är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av en sporbildande bakterie. Bakterien kan drabba många olika djur, framför allt idisslare, och den kan överföras mellan djur och människor.

Det finns olika former av mjältbrand, beroende på hur man har blivit smittad. Det vanligaste är att man får mjältbrand i huden.

Det finns andra former av mjältbrand som kan leda till allvarliga tillstånd men dessa är mycket ovanliga, till exempel mjältbrand i magtarmkanalen eller i lungorna.

Inkubationstiden (tiden från det att man smittas till att man blir sjuk) är vanligen 1–7 dagar men kan vara upp till 60 dagar om man andats in sporer.

Hur smittar mjältbrand?

Vid mjältbrand i huden finns en liten risk att andra personer kan smittas. Andra former av mjältbrand smittar inte mellan människor.

Smitta till människa kan ske i följande situationer:

- Vid kontakt med vävnader eller kroppsvätskor från infekterade djur och djurkadaver.
- Vid hudkontakt med smittade produkter som benmjöl, djurhudar, fällar och ull.
- Vid inandning av aerosol (små luftburna partiklar) som uppstår vid hantering av smittade djurprodukter, som till exempel fällar och ull.
- Genom att äta eller ha kontakt med otillräckligt tillagat kött från självdött djur.
- Vid injektion eller inandning genom näsan av smittade droger.

Inhemska djurprodukter och kött utgör i praktiken ingen smittrisk.

Hur länge är jag smittsam?

När såret är läkt kan du inte smitta längre.

Vad ska jag tänka på för att inte smitta andra?

Mjältbrand är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du måste därför följa vissa regler som din läkare ger dig, så kallade förhållningsregler.

Vårdnadshavare ansvarar för att barn följer förhållningsreglerna.

Förhållningsregler

- Du måste hålla kontakten med din behandlande läkare. Din läkare kommer att berätta för dig när och hur ni ska hålla kontakten.
- Du måste täcka sår och tvätta händerna noggrant efter att du har varit i kontakt med såret.

Din läkare kommer att berätta för dig hur länge förhållningsreglerna gäller.

Tycker du att de förhållningsregler du fått är fel?

Du kan begära att smittskyddsläkaren i din region prövar beslutet om förhållningsregler. Du kontaktar då smittskyddsläkaren i din region.

[Kontaktuppgifter till smittskyddsläkare |](#)

[Smittskyddsläkarföreningen \(slf.se\)](http://slf.se)

Du kan också komma i kontakt med smittskyddsläkaren genom att ringa sjukvårdens växel i din region.

Innan en sådan prövning är klar måste du följa de regler du har fått.

Smittspårning

Enligt smittskyddslagen måste du medverka i smittspårning. Det innebär att du måste ge information till vårdpersonal så att de kan ta reda på när, var och hur du kan ha smittats och om du kan ha smittat andra.

Det du berättar är sekretessbelagt (hemligt) och de personer som du berättar om kommer inte att få reda på vem du är.

Mer information

[Mjältbrand | 1177 \(1177.se\)](#)

