



Smittskydd Skåne

Giltig från och med 2026-06-05

Godkänd av Smittskyddsläkaren

Version 1.0

Latent tuberkulosinfektion – när behandling ges – smittskyddsblad patientinformation

Varför får jag den här informationen?

Ett prov har visat att du har latent tuberkulosinfektion. Din läkare bedömer att du behöver behandling för att minska risken att du senare ska bli sjuk i tuberkulos.

Här får du veta vad du behöver tänka på.

Vad är latent tuberkulosinfektion?

Latent tuberkulosinfektion innebär att du har blivit smittad med tuberkulosbakterier, men du inte är sjuk av det. När en person smittas med tuberkulosbakterier reagerar kroppens immunförsvar och det kan mätas med blodprov eller hudprov. De flesta som är smittade fortsätter att vara friska, men det finns en liten risk att bli sjuk av tuberkulos senare i livet.

Risken att senare bli sjuk är högst för personer som blivit smittade nyligen, för gravida, nyförlösta, barn, ungdomar och för personer med försvagat immunförsvar på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling.

Smittar latent tuberkulosinfektion?

Nej, latent tuberkulosinfektion smittar inte. Tuberkulos kan bara smitta när en person är sjuk och tuberkulossjukdomen sitter i lungorna.

Behöver jag behandling för latent tuberkulosinfektion?

Ja, din läkare bedömer att du behöver behandling för att minska risken att du senare ska bli sjuk i tuberkulos.

Vad ska jag tänka på?

Det finns inget sätt att mäta att alla bakterier är borta efter behandlingen och du kan smittas igen i framtiden.

Om du i framtiden får långvariga (mer än tre veckor) besvär som hosta, feber, nattliga svettningar eller ofrivilligt går ner i vikt ska du kontakta läkare. Berätta att du tidigare fått behandling för latent tuberkulosinfektion.

Kontaktuppgifter

Mottagning.....

.....

Telefon.....