

Region Skåne

Transplantationsenheten



DOKUMENTTYP

Process	Checklista – inskrivning av njur-, pankreas- och njur/pankreas recipient	Godkänt datum	2022-11-22
Skapad av	Alireza Biglarnia, Carin Wallquist, Laila Bruun	Version	1
Godkänd av	Alireza Biglarnia, Carin Wallquist, Laila Bruun	Ärendenummer	Ange ärendenummer
		Gäller fr.o.m.	2022-11-22
		Gäller t.o.m.	2024-11-22
Gäller för	Transplantationsenheten Sus Malmö		

Checklista – inskrivning av njur-, pankreas- och njur/pankreas recipient

Inskrivande läkare

Bedömning av operabilitet följt av kort inskrivningsanteckning med fokus på nytillkomna händelser. Upprepa inte information som finns i anteckningen från transplantationsmottagningen. Undvik kopielänkar.

- Aktuell infektion?
- Annan nyupptäckt kontraindikation?
- Dialysbehov preoperativt?
- Preoperativt dropp?
- Egendiures?
- Hjärt- och lungbedömning. Blodtryck.
- Kärlstatus (ljumskpuls? blåsljud?).
- Bevaka ankomstprover och preoperativ röntgen pulm.

Ordinera immunsuppression. Normalt används följande standardprotokoll kontrollera i journalen att inte annan kombination planerats

- Adport (startdos 0.05 mg/kg) ges på avdelningen.
- Mycophenolat mofetil (1 gram) ges på avdelningen.
- Simulect 20 mg och 500 mg SoluMedrol ordineras och ges på operation innan operationsstart.
- 100 mg Precortalon i v som tillfällig ordination att ges 8 tim efter operationsstart.

Lämna skriftlig information om pågående studie i förekommande fall.

För patienter inför njurtransplantation

- Ordinera Klexane (20 mg, vid APC-resistens 40 mg) som ges på avdelningen.
- Antibiotika (Cefotaxim 1 g som engångsdos, vid allergi ges Dalacin/Clindamycin 600 mg) som ges på operationsavdelningen vid operationsstart.

För patienter inför pankreastranplantation (SPK, PAK, PTA)

- Ordinera antibiotika-profylax Meropenem iv 500 mg vid operationsstart, därefter x 2.
- Cancidas 70 mg iv vid operationsstart
- Klexane 50 mg x 1, ordineras av huvudoperatören med maxdos 1mg/kg/dag.

Komplettera operationsanmälan i Orbit, se lathund.

Ange i Orbit infektionsstatus vid förekomst av resistenta bakterier (till exempel MRSA, VRE, ESBL).

Skriv elektronisk remiss för preoperativ röntgen pulm.

Ibland har lungröntgen redan gjorts med användande av pappersremiss enligt överenskommen rutin med röntgen akut. Även i dessa fall skall elektronisk remiss skrivas i efterhand.

Vid levande donator

Inhämta muntligt samtycke till att, utan tidsbegränsning, spara biopsier och sera för vård och behandling. Notera i journalen.