

Rubrik  
**Immunsuppressionsprotokoll för  
kombinerad njur- och pankreas-  
transplantation (SPK)**

Dokumenttyp  
**Riktlinje**  
  
Faktaägare  
**Biglarnia Alireza**

Gäller från  
**2020-01-28** Giltigt t o m  
**2022-01-28**

Sida:

1 (1)

Författare  
**Biglarnia Alireza**

*Utskrivet dokument gäller inte som  
original!*

Version:

1

Gäller för (enhet)  
**Sektion njurtransplantation, SUS**

## Immunsuppressionsprotokoll för kombinerad njur- och pankreas-transplantation (SPK)

Ersätter TP 027-08 sida 1 av 2.

Författare: Alireza Biglarnia, Carin Wallquist, Laila Bruun

Dag/ månad	Thymo- globulin*	Steroider	Adport (tacrolimus)	MMF
0 (start innan op)	1 mg/kg	Solu-Medrol 500 mg iv	Påbörjas med 0,05 mg/kg x 2. Målkonc 8-10	1 g x 2
0 (6 tim efter pankreas påsläpp)		Solu-Medrol 80 mg iv		”
1	1 mg/kg	45 mg x 2 po		”
2	1 mg/kg	40 mg x 2 po		”
3	CD3- analys	35 mg x 2 po		”
4	vb	30 mg x 2 po		”
5	vb	25 mg x 2 po		”
6		20 mg x 2 po		”
7		30 mg x 1 po		”
8		20 mg x 1 po		”
9		15 mg x 1 po		”
30		12,5 mg x 1		MPA- AUC
60		12,5 mg x 1		”
61-90		10 mg x 1		”
3 månader		7,5 mg x 1		”
6 månader och framåt		5 mg x 1	Målkonc 5-8	”

\* Den kumulativa dosen av thymoglobulin skall inte överstiga 6-7 mg/kg. Detta för att minimera risken för lymfoproliferativa maligniteter.