

# Region Skåne

## Transplantationsenheten

### DOKUMENTTYP

Process	Immunsuppression njure ordinär risk	Godkänt datum	2024-02-07
Skapad av	Alireza Biglarnia, Laila Bruun, Carin Wallquist	Version	3
		Ärendenummer	Ange ärendenummer
Godkänd av	Alireza Biglarnia, Laila Bruun, Carin Wallquist	Gäller fr.o.m.	2023-05-04
		Gäller t.o.m.	2025-05-03
Gäller för	Sektion njurtransplantation, SUS		

## Immunsuppression njurtransplantation med ordinär risk

Förstagångstransplantation med negativ CDC-korstest och inga donator-specifika antikroppar (DSA)

Re-transplantationskandidater utan repeated mismatch och utan pre-formerade DSA samt negativ CDC korstes

### Immunsuppressionsprotokoll

Dag/vecka/månad	Simulect *	Steroider	Tacrolimus	MMF
0 (op dag)	20 mg iv pre-op	Solu-Medrol 500 mg iv		1 g x 2
0 (6 tim efter påsläpp)		Solu Medrol 80 mg iv		"
1		45 mg x 2 po		"
2		40 mg x 2 po		"
3		35 mg x 2 po		"
4	20 mg iv pre-op	30 mg x 2 po		"
5		25 mg x 2 po		"
6		20 mg x 2 po	Påbörjas med 0,05 mg/kg x2;	"
7		30 mg x 1 po	målkonc:	"
8		20 mg x 1 po	5-8	"
9		15 mg x 1 po		"
Vecka 4		12,5 mg x 1		
Vecka 6		10		MPA-AUC
Vecka 8		7,5		
3 månader		5		"
Månad 6		Kan trappas ner till 2,5 mg dagligen #		"

## Induktion med Simulect ges inte

1. vid förstagångs-LD transplantation utan HLA-antikroppar.
2. vid förstagångs-AD transplantation med DBD <50 år, inga HLA-antikroppar, kall ischemitid <15 h