

Transplantationskliniken, SUS Malmö

Checklista – inskrivning av levande donator

Dokument: TP019-03 , 2018-06-15 A. Biglarnia

Inskrivande doktor

Sign

- Samtyckesblanketten ifylld och påskriven. Denna inkluderar samtycke enligt Bio-banklagen och för registrering i Scandiatransplants register.
- Ordinerar Klexane, normalt ges 20 mg preop på avdelningen.
Kontrollera först om APC-resistens föreligger, i så fall dubbel dos.
- Ordinerar Antibiotika, normalt 2 g Ekvacillin som engångsdos.
Vid pc-allergi ges 600 mg Dalacin. Ges preop på op-avd före op-start.
- Kontrollera att sista korstestsvaret finns i journalen.
- Komplettera i Orbit (Operationsbehov->Preop anamnes); ange i Orbit infektionsstatus vid förekomst av resistenta bakterier (t ex MRSA, VRE, ESBL).
- Kort diktat inkluderande status, ffa cor-pulm och blodtryck

Sjuksköterska avdelningen

- ID-kontroll
- Längd, vikt
- Ta fram provsvar, kontakta doktor vid patologiska svar
- Kontrollera att Ekg, blodgruppering och BAS-test finns
- Se till att patienten fyller i röd lapp (anhörig att kontakta efter operationen)
- Kontrollera tiden till narkosbedömning och se till att patienten kommer dit
- Operationsförberedelser (dusch, trimning, navelvård)

Operatören

- Se till att patienten ritas på
- Kontrollera provsvar tagna vid inkomsten