

Transplantationskliniken, SUS Malmö

Flödesschema för vårdtiden njurdonator

Dokument: TP 007
2017-11-07 A. Biglarnia

Dagen före operation	<ul style="list-style-type: none">• Inskrivning av sjuksköterska och läkare (se checklista)• Narkosbedömning och ordination premedicinering av narkosläkare• Preoperativ information från sjukgymnast (uppstigningsteknik m.m.)• Dusch ("dubbeldusch") med Hibiscrub 2 ggr (första gången på kvällen före och andra gången på operationsdagens morgon)• Håravkortning och navelvård• Trombosprofylax* (Klexane s.c.) kl 20• Sätt på stödstrumpor	•
Operationsdagen	<ul style="list-style-type: none">• Premedicinering, till preop 07.00.• Åter från UVA på eftermiddagen• IV vätska enligt ordination• Smärtlindring och antiemetika• NEWS vid återkomst till avd23 (oftare vid behov)• Vätskebalans• Kontrollera op-snittet, detta görs därefter dagligen med byte av förband vid behov• Kontrollera painbuster: sensorerna skall vara klistrade på huden och klämmorna skall vara öppna	•
Dag 1 (dagen efter op)	<ul style="list-style-type: none">• Blodprover: <i>Hb, LPK, CRP, kreatinin, Na, K</i>• Mobilisering och andningsgymnastik med sjukgymnast• KAD drages• Dricka och äta• NEWS plus vätskebalans	•
Dag 2	<ul style="list-style-type: none">• Blodprover: <i>Hb, LPK, CRP, kreatinin, Na, K</i>• Vid APC-resistens påbörjas träning av Klexane-injektioner• NEWS	•

Dag 3-6	<ul style="list-style-type: none"> • Blodprover: <i>Hb, LPK, CRP, kreatinin, Na, K</i> • <i>Painbuster tas bort om slut</i> • Trappträning med sjukgymnast • Utskrivning förbereds: recept, sjukskrivning, återbesök, reseintyg • Hemgång enligt önskemål dag 3-6 • NEWS • Efterbeställ eGFR på dagens prover om hemgång 	•

* *Trombosprofylax ges under vårdtiden; om heterozygot APC-resistens eller ökad trombosrisk av annan orsak föreligger skall patienten fortsätta efter hemgång i totalt fyra veckor.*