

Checklista – inskrivning av njurrecipient

Gäller från 2018-06-15	Ersätter (Dokument ID, datum) KHB TP 008-05	Utarbetad av (Datum, Namn eller gruppnamn) 2017-06-08 A. Biglarnia, L. Bruun, C. Lehning, S. Nilsson	Fastställd av (Datum, Namn) A. Biglarnia Dokumentägare A. Biglarnia
---------------------------	--	---	--

Detta dokument förvaras i:
Original: Kvalitetshandbok www.tpmas.com/pm

Checklista – inskrivning av njurrecipient

Inskrivande doktor

Sign

- Bedömning av operabilitet följt av kort inskrivningsanteckning med fokus på nytillkomna händelser. Upprepa inte information som finns i anteckningen från tp-mottagningen. Undvik kopielänkar.
- Aktuell infektion?
 - Annan nyupptäckt kontraindikation?
 - Dialysbehov preoperativt?
 - Preoperativt dropp?
 - Egendiures?
 - Hjärt-lungbedömning. Blodtryck.
 - Kärstatus (ljumskpuls? blåsljud?).
 - Bevaka inkomstprover och preop rtg pulm.

- Ordinera immunsuppression. Normalt används följande standardprotokoll (kontrollera i journalen att inte annan kombination planerats):
- Adport (startdos 0.06 mg/kg) ges på avdelningen.
 - Mycophenolat mofetil (1 gram) ges på avdelningen.
 - Simulect 20 mg och 500 mg SoluMedrol ordineras och ges på operation innan op-start.
 - 100 mg Precortalon i.v. som tillfällig ordination att ges 8 tim efter op-start.

Lämna skriftlig information om pågående studie i förekommande fall.

- Ordinera Klexane (20 mg, vid APC-resistens 40 mg) som ges på avdelningen och Antibiotika (Cefotaxim 1 g som engångsdos, vid allergi ges Dalacin/Clindamycin 600 mg) som ges på op-avd vid op-start.

- Komplettera operationsanmälan i Orbit, se lathund. Ange i Orbit infektionsstatus vid förekomst av resistenta bakterier (t ex MRSA, VRE, ESBL).

- Skriv elektronisk remiss för preop rtg pulm.

Ibland har lungröntgen redan gjorts med användande av papperremiss enligt överenskommen rutin med rtg akut. Även i dessa fall skall elektronisk remiss skrivas i efterhand.

Vid levande donator:

- Inhämta muntligt samtycke till att, utan tidsbegränsning, spara biopsier och sera för vård och behandling. Notera i journalen.