

Protokoll för ordinär immunologisk risknivå

- Förstagångstransplantation med negativ CDC-korstest och inga donator-specifika antikroppar (DSA)
- Re-transplantationskandidater utan repeated mismatch och utan pre-formerade DSA samt negativ CDC korstest

Immunsuppressionsprotokoll

Dag/vecka/månad	Simulect *	Steroider	Tacrolimus	MMF
0 (op dag)	20 mg iv pre-op	Solu-Medrol 500 mg iv	Påbörjas med 0,05 mg/kg x2; Målkonc: 5-8	1 g x 2
0 (op dag)		Solu Medrol 80 mg iv		”
1		45 mg x 2 po		”
2		40 mg x 2 po		”
3		35 mg x 2 po		”
4	20 mg iv pre-op	30 mg x 2 po		”
5		25 mg x 2 po		”
6		20 mg x 2 po		”
7		30 mg x 1 po		”
Vecka 2		15 mg x 1 po		”
Vecka 3		15 mg x 1 po		MPA-AUC
Vecka 4		12,5 mg x 1		”
Vecka 5		10		”
Vecka 7		7,5		”
Vecka 8		5		”
Månad 6		Kan tappas ner till 2,5 mg dagligen eller var annan dag #		”

* Induktion med Simulect ges inte vid HLA-identisk eller zero mismatch LD transplantation.

Vid IgA-nefrit rekommenderas fortsatt prednisolon behandling