

Transplantationskliniken , SUS Malmö

Behandling med intravenöst immunglobulin IVIG

2017-11-07 A. Biglarnia

1. Indikation för behandling med IVIG kan vara förebyggande i situationer med högre immunologisk risk eller som behandling vid antikroppsmedierad rejektion. Vid ABO-inkompatibla transplantationer ges ofta doser i storleksordningen 30 gram. Privigen kan ges upp till 1-2g/kg vid rejektion eller förekomst av donator-specifika HLA-antikroppar (vid adekvat diures). Preparatet vi använder är **Privigen®**, CSL Bering (100 mg/ml). Trombosprofylax med Klexane (40mgx1, sc, per dag i en vecka) skall ges.
2. Anteckna eller klistra in batchnummer på ordinationslistan, om flera flaskor ges måste alla nummer dokumenteras. Detta för att göra det möjligt att spåra källan vid biverkan, på samma sätt som för andra blodprodukter.
3. Kontrollera **blodtryck, puls och temperatur** före infusionsstart, före varje ökning av infusionstakten, direkt efter samt en gång i timme efter att den maximala infusionshastigheten har uppnåtts. Dessutom skall kontroller tas vid symptom (exempelvis huvudvärk). Vid symptom kontaktas ansvarig läkare och infusionen stoppas.
4. Starta infusionen vid **första behandlingstillfället** med 0.3 ml/kg kroppsvikt/tim under 30 minuter. Om behandlingen tolereras väl ökas infusionstakten med 30 ml/tim var 15:e minut till en maximal hastighet på 2 ml/kg kroppsvikt/tim.

Doseringarna gäller vuxna, för barn se FASS.

5. Innan start av Privigen ges 40 mg klexane s.c. Behandlingen fortsätts med samma dos under 7 dagar.