

Rubrik
**Blodsockerregistrering
efter transplantation**

Författare
Carin Wallquist, Helena Pollard

Gäller för (enhet)
Sektion njurtransplantation, SUS

Dokumenttyp
Instruktion

Faktaägare
Alireza Biglarnia

Utskrivet dokument gäller inte som original!

Gäller fr o m 2020-05-12
Gäller t o m 2022-05-12



Sida: 1 (2)
Version: 1

| |
|----|
| År |
|----|

BLODSOCKERREGISTRERING

Personnr:

Namn:

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |

År

BLODSOCKERREGISTRERING

Personnr:

Namn:

Sida: 2 (2)

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |
| P-Glukos | | | | | | | | | | |
| Datum / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Tid: | | | | | | | | | | |

Instruktioner: Blodsocker kontrolleras 2 ggr/dag, dvs fastevärde på morgonen och värde före middag, de första 6 veckorna efter transplantation. Därefter kontrolleras blodsocker 2 ggr/månad = 1 gång varannan vecka, dvs fastevärde på morgonen fram till 6 månader efter transplantationen. **Ta med detta blad till varje läkarbesök.**