

Immunsuppressionsprotokoll för kombinerad njur- och pankreas-transplantation (SPK)

Dag/ månad	Simulect (basilixi mab)	Steroider	Adport (tacrolimus)	MMF
0 (innan op)	20 mg iv pre-op	Solu-Medrol 500 mg iv	Påbörjas med 0,05 mg/kg x2; Målkonc: 8-10	1 g x 2
0 (6 tim efter påsläpp)		Solu Medrol 80 mg iv		”
1		45 mg x 2 po		”
2		40 mg x 2 po		”
3		35 mg x 2 po		”
4	20 mg iv pre-op	30 mg x 2 po		”
5		25 mg x 2 po		”
6		20 mg x 2 po		”
7		30 mg x 1 po		”
8		20 mg x 1 po		”
9		15 mg x 1 po		”
30		12,5 mg x 1		MPA-AUC
60		12,5 mg x 1		”
61-90		10		”
3 månader		7,5		”
6 månader och framåt		5		Målkons 5-8

Immunsuppressionsprotokoll för singel pankreastransplantation SPT (PTA och PAK)

Dag/månad	Thymo- globulin*	Steroider	Adport	MMF
O (innan op)	1 mg/kg	Solu-Medrol 500 mg iv	Påbörjas med 0,05 mg/kg x 2; Målkons: 8-10	1 g x 2
0 (6 tim efter påsläpp)		Solu-Medrol 80 mg iv		”
1	1 mg/kg	45 mg x2 po		”
2	1 mg/kg	40 mg x 2 po		”
3	CD3-analys	35 mg x 2 po		”
4	Vb	30 mg x 2 po		”
5	Vb	25 mg x 2 po		”
6		20 mg x 2 po		”
7		30 mg x 1 po		”
8		20 mg x 1 po		”
9		15 mg x 1 po		”
30-60		12,5 mg x 1 po		MPA- AUC
61-90		10 mg x 1 po		”
3 månader		7,5 mg x1 po		”
6 månader och framåt		5 mg x 1 po		Målkons: 5-8

* Den kumulativa dosen av thymoglobulin skall inte överstiga 6-7 mg/kg. Detta för att minimera risken för lymfoproliferativa maligniteter.