

ARBETSBLAD FÖR VACCINATIONSPLANERING INFÖR RESA BARN < 6 MÅN

Skickas via mail till; kunskapscentrum.bhv.pv@skane.se

Barnets ålder (veckor alt månader):			
Resmål:		Datum för resa:	
Vistelsetid:		Ålder vid resa:	
Anamnes:			
Ditt namn o BVC:		Tel:	

Vaccination	Ges enligt programmet vid:	Förslag: antal doser, intervall, tidpunkt Signatur läkare;
Tuberkulos	Beroende på riskbedömningen, antingen vid 6 veckor eller 6 månader	<i>BCG om hög risk, noggrann anamnes för att utesluta immunbrist</i>
Rotavirus	6 och 12 veckor. Dos 1 ska ges före 12 veckor, dos 2 före 16 veckor	Dos 1 tidigast vid 6 veckor Dos 2 tidigast 4 veckor efter dos 1
Difteri, stelkramp, kikhosta	3, 5, 12 månader, 5 år	Dos 1 tidigast vid 6 veckor Dos 2 rekommenderas 4 veckor efter dos 1 och helst 2 veckor innan avresa Dos 3 rekommenderas tidigast 4 veckor efter dos 2 Boosterdos vid 1 år, tidigast 6 månader efter dos 3
Polio	3, 5, 12 månader, 5 år	<i>Se ovan</i>
Haemophilus influenzae typ b	3, 5, 12 månader	<i>Se ovan</i>
Hepatit B	3, 5, 12 månader, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer	<i>Se ovan</i>
Invasiva pneumokocker	3, 5, 12 månader	<i>Se ovan</i>
Mässling, påssjuka, rubella	18 månader	<i>För ung att få vaccin mot dessa sjukdomar</i>

Utöver ovanstående vaccinationer kan andra vaccin behövas inför resa. För vaccinationer utöver de som ingår i barnvaccinationsprogrammet hänvisas till vaccinationscentral eller dylikt.

Ordination:			
Ansvarig läkare:		Datum:	