

Frågor att ställa till föräldrar vid BCG-vaccinationstillfället (eller uppgifter från barnets journal eller remiss)

Indikation BCG vaccination

Har barnet ökad risk för tuberkulos? Ja Nej

Har ditt barn fått vaccin mot Tuberkulos (BCG) tidigare? Ja = barnet ska ej vaccineras mot tbc

Har ditt barn något ärr efter tidigare BCG-vaccination? Ja = barnet ska ej vaccineras mot tbc

Tuberkulinprovning med PPD

Har ditt barn fått en tuberkulinprovning med PPD? Ja Nej

Satt Datum _____

Avläst Datum _____

Till personalen: Om PPD resultat är positiv > 0 mm eller IGRA är positiv ska barnet inte vaccineras

Indikation tuberkulintest (TST) med PPD innan BCG?

Har någon i barnets närhet aktiv *smittsam* tuberkulos sedan barnet har fötts eller kontrollerats för misstänkt aktiv tuberkulos? Ja Nej

Om ja; vem?

När? Datum _____

Har ditt barn varit utomlands¹? Ja Nej

Om ja; var? _____

När? Hur länge? _____

Hade ditt barn närkontakt² med lokalbefolkningen? Nej

*Om JA på någon av ovanstående frågorna bör TST sättas **3 månader efter exponeringen och före BCG vaccinationen ges**. Barn över 2 år kan testas för TB-smittan med ett IGRA blod test*

Är barnet > 18 månader gammal Ja = TST bör sättas rutinmässigt

¹ Enligt Folkhälsomyndighetens "Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos" (2020) behöver barn yngre än 18 månader inte rutinmässigt TST testas inför BCG vaccination såvida barnet ej varit utsatt för smittrisk i familjen, hushåll eller i samband med en utlandsvistelse. Om barnet innan vaccinationstillfället rest till ett land med *hög* risk bör TST göras innan vaccinationen. Om barnet rest till land med *ökad* risk får *individualisering* göras beroende på resmål, resans längd och karaktär. Kortare resa till land inom Europa motiverar i regel ej TST före vaccination.

² Närkontakt: Som närkontakter räknas personer som haft långvarig, regelbunden och nära kontakt med den sjuka och delat andningsluft i sovrum, badrum och kök, dvs. huvudsakligen familjemedlemmar, hushållskontakter och sexualpartners. Arbetskamrater och klasskamrater kan ibland hamna i denna kategori, exempelvis vid hela arbetsdagar tillsammans i en avgränsad lokal. En slags riktlinje som används internationellt är personer som haft mer än 8 timmars nära kontakt med högsmittsamt fall eller mer än 40 timmar vid låg smittsamhet hos indexfallet (FOHM, 2020, s 26)

Att tänka på

Har ditt barn blivit vaccinerat mot mässling-påssjuka-röda hund eller gula febern senaste månaden?

Ja Nej

Det ska ha gått minst 4 veckor efter MPR eller gula feber vaccination

Har ditt barn nyligen haft någon virusinfektion som influensa, mässling, påssjuka, röda hund eller vattkoppor?

Ja Nej

Det ska ha gått minst 2 veckor efter tillfrisknandet

Kontra-indikationer

Finns generaliserat **eksem eller hudinfektion** i närheten av injektionsområdet på vänster överarm?

Ja Nej

Har barnet haft många och svåra infektioner?³

Ja Nej

Har barnet någon **allvarlig sjukdom**, som leukemi, lymfom eller generaliserad malign sjukdom (även strålbehandling)?

Ja Nej

Har barnet under den senaste månaden behandlats med intravenös eller peroralt kortison eller andra medel som sätter ned immunförsvaret?

Ja Nej

Har någon i familjen/släkten insjuknat i allvarlig immunbristsjukdom⁴?

Ja Nej

Är modern som födde barnet eller barnet HIV-positiva⁴?

Ja Nej

Har barnets syskon, kusiner eller föräldrarnas syskon dött i späda ålder⁴?

Ja Nej

Har modern fått immunmodulerande behandling under sen graviditet*?

Ja Nej

* Barn som exponerats för immunmodulerande behandling under sen graviditet (t ex biologisk eller tiopuriner) kan BCG-vaccineras först efter kontakt med moderns behandlande läkare.

Om JA på någon av ovanstående frågorna skall BVC läkare kontaktas före BCG vaccinationen ges

Kontakt vid behov av diskussion

Kunskapscentrum för barnhälsovård

Administratör 040-6234147

³ Barn med primär immunbristsjukdom har många och svåra infektioner. De växer inte normalt (failure to thrive), har månadslånga infektioner i mun och i blöjregionen (torsk), oklara eksemliknande hudutslag och luftvägsinfektioner som förvärras.

⁴ Denna fråga ska ställas om barnet är < 6 månaders ålder. SCID screening i PKU-provet infördes i Sverige 190805.