

Hantering av vaccination mot covid-19 vid allergi hos individer som är 12 år eller äldre

Rekommenderad hantering

- Följ rekommendationerna från svenska föreningen för allergologi nedan.
- Alla vaccinatörer tar emot och vaccinerar kategori A.
- Vaccinatörer som har motsvarande medicinsk nivå som vårdcentral tar emot kategori B och C.
 - Kategori B vaccineras hos dessa vaccinatörer
 - Kategori C remitteras till sjukhus:
 - Efter bedömning kan de flesta vaccineras på sjukhus under övervakning

Remisser skickas till:

- Lund
 - Pappersremisser: Vaccinationsenheten SUS, Baravägen 1, 221 85 LUND
 - Säker e-post: vaccination.sus.remisser@skane.se
- Helsingborg
 - Infektionsmottagningen, Helsingborgs Lasarett, 251 87 Helsingborg
- Kristianstad
 - Centralsjukhuset Kristianstad, VO Medicin allergimottagningen: Dr. Håkan Leksell, 291 85 Kristianstad

Ovanstående rekommendationer är framtagna av Projektledningsgruppen för vaccination mot covid-19 i Skåne.

/Erik Sturegård, Överläkare Smittskydd Skåne, Projektledningsgruppen för vaccination mot covid-19 i Skåne

Rekommendationer från svenska föreningen för allergologi ([Riktlinjer | SFFA](#)):

Följande riktlinjer gäller för bedömning och rutiner vid vaccination med de tre godkända vaccinerna Comirnaty (Pfizer) och Spikevax (Moderna) och Vaxzevria (AstraZeneca) för personer från 12 år och uppåt:

A. Gäller alla vaccinerade:

Kvarstannar minst 15 minuter efter vaccination. Anafylaxiberedskap ska finnas på plats

B. För de som haft en svår* allergisk reaktion mot allergen såsom födoämnen, insektsstick, latex, kontrastmedel, lokalanestetika eller läkemedel peroralt (t.ex. antibiotika):

Kvarstannar minst 30 minuter efter vaccination där det förutom anafylaxiberedskap även ska finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp (exv. på vårdcentral).

C. 1. De som haft en svår* allergisk reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel, eller tidigare reagerat med upprepade anafylaxier mot läkemedel – bedöm om personen kan ha reagerat på PEG-liknande produkter såsom förutom PEG, polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja. Om ingen överkänslighet föreligger mot PEG-liknande produkter:

Bedöm nyttan jämfört med risken för vaccination mot Covid-19.

Vaccinering bör ske på sjukhus eller specialistklinik med möjlighet till mera avancerad sjukvård vid behov (inklusive narkosberedskap). Individuell bedömning av observationstid efter eventuell vaccination.

2. De som har haft en svår* allergisk reaktion mot PEG/polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja:

Avvakta (kontraindicerat) tills vidare att ge vaccin mot covid-19.

3. Patient med systemisk mastocytos

Vaccinering bör ske på sjukhus eller specialistklinik med möjlighet till mera avancerad sjukvård vid behov (inklusive narkosberedskap). Individuell bedömning av observationstid efter eventuell vaccination.

*Med **svår** allergisk reaktion avses reaktion som är så svår att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus

Övrigt

Anafylaxiberedskap ska finnas överallt där vaccinerna ges enligt gängse rutiner för vaccinationer.

Ge inte antihistamin profylaktiskt. Detta kan maskera de tidiga hudreaktionerna på en anafylaxi. Individer med känd/diagnosticerad urtikaria-problematik och daglig medicinering med antihistaminer bör dock ej göra uppehåll med denna.

En snabb (inom några minuter) eller svår allergisk reaktion mot en första vaccination mot Covid--19-vaccinerna innebär att en ny dos med något av dessa vacciner inte ska ges.