


Region Skåne Område Läkemedel Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret			
Iordningställande av administreringsprutor Nuvaxovid	Dokumenttyp Vägledande		Gäller fr.o.m 2022-03-03
	Dokumentnr. BI817	Utgåva 01	Sida 1 av 2
Utfärdat av/Reviderad av		Godkänt av	

Förberedelser

Varje flaska med Nuvaxovid, dispersion för injektion innehåller vaccin till 10 doser. För varje flaska man ska iordningställa 10 doseringssprutor behövs följande material:

Antal	Produkt
1	Nuvaxovid, dispersion för injektion, flerdosflaska
Minst 1	Injektionstork sprit 70% IPA, 30x30 mm
10	Sprutor (Art.nr: SYL12525 centrerad, 1 ml gradering 0,01ml, integrerad kanyl (25G) samt stickskydd)
10	Sprutetiketter (Art.nr: NUVAXOVID-ETK-1)

Tillämpa basala hygienrutiner och klädregler samt arbeta aseptiskt.

Färdigställande av administreringsprutor

Ta ut injektionsflaskan med vaccin ur kartongen i kylskåpet omedelbart före användning

1. Rengör och desinfektera arbetsytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
2. Anteckna datum och tid för kassering på injektionsflaskans etikett. Använd inom 6 timmar efter första punktionen.
3. Vänd försiktigt flaskan före och mellan varje uppdragning. OBS! Får ej skakas!
4. Kontrollera injektionsvätskan i vaccinflaskan, den ska vara färglös till svagt gul i färgen, klar till svagt opalescerande dispersion, fri från synliga partiklar. Om innehållet avviker ska produkten reklamerar.
5. Med aseptisk teknik, torka med injektionstork av gummimembranet på flaskan.

Observera att kanylens skyddshylsa ska återanvändas. Hantera så att aseptik bevaras vid brytande av kanylförpackningen.

6. Dra upp **0,5 ml** av vaccinlösningen.
7. Sätt tillbaka skyddshylsan på injektionskanylen.
8. För varje ny dos, tag en ny spruta samt kanyl och upprepa steg 3 till 7 ovan. I det fall alla sprutor inte dras upp vid samma tillfälle börja på steg 1.
9. Ange hållbarhetsdatum, klockslag (**6 timmar från första punktion av gummimembranet, se information på vaccinflaska**) och signera på sprutetiketterna. Fäst därefter en etikett på respektive färdigställd spruta.
10. Obs! Vaccin från flera injektionsflaskor ska inte blandas för att få ytterligare doser.
11. Förbrukade vaccinflaskor ska destrueras som riskavfall.

Hantera därefter administreringsprutorna efter lokal rutin på enheten.

**lordningställande av
administreringsprutor för
Nuvaxovid**

Dokumenttyp
Vägledande

Dokumentnr.
BI817

Utgåva
01

Gäller fr.o.m
2022-03-03

Sida 2 av 2

Historik

Dokument id	Ersätter dokument id	Ändringar/Revisionsorsak
BI817-01	Nytt dokument	Nytt dokument