

Covid-19-vaccinationer

Anna Lindén, Vaccinsamordnare

anna.linden@skane.se

Per Hagstam, Bitr Smittskyddsläkare

per.hagstam@skane.se

1

Påfyllnadsdoser till vissa personer med allvarligt nedsatt immunförsvar – uppdaterad rutin april 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en extrados av vaccin mot covid-19 erbjuds till vissa patientgrupper med måttligt till allvarligt nedsatt immunförsvar: [En extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist — Folkhälsomyndigheten \(folkhalsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsrapporter/2022/04/20220404_rekommenderas_vid_immunbrist).

Extradosen kan ges från åtta veckor efter dos två, och skall ses som en tredje dos i den primära immuniseringsserien till personer som förväntas ha ett sämre immunsvaret på vaccinationen.

Extradosen är alltså inte detsamma som den påfyllnadsdos som nu erbjuds till samtliga över 18 års ålder då det gått fem månader sedan andra dosen gavs.

Personer med nedsatt immunförsvar som tidigare erhållit en extrados av vaccin mot covid-19 också skall vaccineras med en påfyllnadsdos enligt gällande rekommendationer. Enligt besked från Folkhälsomyndigheten skall denna ges tidigast tre månader efter extradosen.

Från 220404 rekommenderas gruppen en andra påfyllnadsdos (dos 5), tidigast tre månader efter föregående dos.

Patienterna identifieras och kallas av respektive specialistkliniker. Patienten uppmanas ta med brevet vid vaccinationstillfället.

Vaccinationen utförs enligt ordinarie rutin för påfyllnadsdos och registreras enligt kronologiskt dosnummer. (Om patienten erhållit en extra dos ska påfyllnadsdosen registreras som dos 4 i PMO. Den andra påfyllnadsdosen registreras som dos 5)